



Antracol®
Combi X 65/2 WP



Antracol®
Combi X 65/2 WP

800 gr e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
6805/02-06-2000

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Εγγ. Σύμβαση: propineb: 65% β/β,
triadimenol: 2% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 26,51% β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων

ενός επαφής (propineb) και ενός διασυστηματικού
(triadimenol) με προστατευτική, θεραπευτική
και εξοντωτική δράση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

BayWin
Πρόγραμμα Επιβράβευσης

BONUS
STICKER



Antracol®
Combi X 65/2 WP

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Επιβάλλει σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει propineb και hexamethylene tetramine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην αναπνέετε εκνεφώματα. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. • Μαζεύετε τη χυμένη ποσότητα. • Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη/φόρτωση. • Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο, ολόσωμη φόρμα, πλατύγυρο καπέλο και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε καλλιέργεια αμπελιού. • Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο, ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στις υπόλοιπες καλλιέργειες. • Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας και του πεπονιού από τα επιφανειακά ύδατα. • Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τη μη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Γενικές συστάσεις:
Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή στον καθαρό αέρα. Διατρίψτε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα καλά με νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 5 λεπτά της ώρας και συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμείνει ή ενταθεί καλέστε γιατρό.
Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης, συνιστάται πλύση στομάχου εντός των πρώτων δύο (2) ωρών εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Συνιστάται χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate. Υποδεικνύεται αυστηρά αποχή από κατανάλωση αλκοόλ για 1-2 εβδομάδες λόγω αντίδρασης διασυνφύραξης (antibiose effect).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



Antracol®
Combi X 65/2 WP

ΑΝΤΡΑΚΟΛ ΚΟΜΠΙ 65/2 WP

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός επαφής (propineb) και ενός διασυστηματικού (triadimenol) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ
Ωίδιο (Uncinula necator), **Περωνόσπορος** (Plasmopara viticola): Πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ. και μέχρι την αλλαγή του χρώματος των ραγών ανά 10-12 ημέρες. **Δόση:** 200 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (300 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/ στρέμμα.

ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)
Περωνόσπορος (*Phytophthora infestans*), **Αλτερνάρια** (*Alternaria solani*): Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες. **Δόση:** 200 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (280 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 140 λίτρα/στρέμμα.

ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ)

Ωίδιο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*), **Περωνόσπορος** (*Pseudoperonospora*

cubensis): Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες. **Δόση:** 200-250 γρ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (400-500 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200 λίτρα/ στρέμμα.

ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ)

Ωίδιο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*), **Περωνόσπορος** (*Pseudoperonospora cubensis*): Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες. **Δόση:** 200-250 γρ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (200-250 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Αμπέλι: 2.
Τομάτα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ): 3.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι: 35 ημέρες.
Τομάτα, Αγγούρι, Πεπόνι: 21 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Στις καλλιέργειες αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.



Antracol®
Combi X 65/2 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίασμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απευθείας σε ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:
Βλέπε άνω μέρος κυτίου.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**



GR801966368

Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropsscience.gr

