

75WG



NATIVO®
75WG

NATIVO 75 WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του ωιδίου και της μαύρης σήλης στο αμπελί, παρέχοντας προστασία τόσο στα φύλλα όσο και στους βλαύτες (τοσίπια).

Το trifloxystrobin, είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρίνων με διεκασματική δράση. Οι στρομπιλουρίνες παρεμποδίζουν τη μεταχονδριακή αναπνοή, διακόπτοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην κυτοχρωμική αλυσίδα. Το tebuconazole σε βλαγμικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι το ένα τρίτο (1/3) με νερό. Διαλύστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΑΔΙΑ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΤΕΣΤΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΩΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες ποικιλίες): **Οιδία (Uncinula necator)***: Προληπτικοί / Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης μέχρι το τέλος της άνθησης. **Δόση**: 16 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (16 γρ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού**: 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών**: 2/14.

Μαύρη σήλη (Guignardia bidwellii)*: Προληπτικοί / Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης μέχρι το τέλος της άνθησης. **Δόση**: 12 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (12 γρ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού**: 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών**: 2/14.

ΑΜΠΕΛΙ (ονοποπίσμιες ποικιλίες): **Οιδία (Uncinula necator)***: Προληπτικοί / Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι ράγες να αποκτήσουν το χρώμα τους. **Δόση**: 16 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (16 γρ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού**: 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών**: 2/14.

Μαύρη σήλη (Guignardia bidwellii)*: Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι ράγες να αποκτήσουν το χρώμα τους. **Δόση**: 12 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (12 γρ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού**: 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών**: 2/14.

Παρατήρηση:

* Σε περίπτωση συνδυασμένης προσβολής από ωιδίο και μαύρη σήλη, να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση των 16 γρ./100 λίτρα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Αμπελί (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης.

Αμπελί (Ονοποπίσμιες ποικιλίες): 35 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΜΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Να μη γίνεται χρήση του σκευάσματος με υψηλές θερμοκρασίες. Διαχωρίση ανθεκτικότητας: Προληπτικές επεμβάσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των παθογόνων.

Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων / καλλιεργητική περίοδο: 2. Επεμβάσεις σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλη ομάδα και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν των Oidii και των DMIs.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις. Το Nativio δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση επί των ζυμώσεων και δεν τροποποιεί τις οργανοληπτικές ιδιότητες των οίνων. Το Nativio μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το κλείσιμο του τοσίπια για τους αμπελώνες που προορίζονται για την παραγωγή ονοποπίσμιων σταφυλίων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση/καταστροφή του Nativio 75 WG πρέπει να γίνεται σε υμεικτικούς που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξεπλύματα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με σχήμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποδοθεμένα σε σημείο συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.



NATIVO®
75WG

ΣΥΝΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος δροσερό και αεριζόμενο, σε κλειδωμένο χώρο, σε θερμοκρασία έως +40°C, μακριά από παιδιά και χωριστά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες Βοήθειες: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από σπύγχυμ: **Γενικά:** Αφαιρέστε άμεσα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα και απομακρύνετε τα με ασφαλεία. Μεταφέρετε τον παθόντα από την μολυσμένη περιοχή στον καθαρό αέρα και ξεραφάστε τον τις βασικές ζωτικές λειτουργίες. Τοποθετήστε τον σε σταθερή πλάγια θέση. Καλέστε γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία και/ή τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και τα παπούτσια και πλύνετε καλά το δέρμα με άφθονο σαπούνι και νερό (ή polyethylenglycol 400 εάν είναι διαθέσιμο). Ξεπλύνετε στη συνέχεια με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια και την περιοχή κάτω από τα βλεφάρια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής – σε περίπτωση που υπάρχουν – μετά τα πρώτα 5 λεπτά, και ύστερα συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια. Σε περίπτωση που αναπτυχθεί ή παραμείνει η ενόχληση ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Ακολουθήστε τα γενικά μέτρα. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν απαιτείται πλύση στομάχου υπό κανονικές συνθήκες. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλων ποσοτήσεων του προϊόντος, να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας και sodium sulfate.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.



NATIVO®
75WG

80γρ. e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
60.310 / 21-3-2011

Εναιωρηματοποιησιμοί κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεση:

tebuconazole 50% β/β, trifloxystrobin 25% β/β

Βοηθ. ουσίες: 20,8% β/β

Διασυστηματικό
Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος
για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



NATIVO®
75WG

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer **24/7**
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Υποπο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει trifloxystrobin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

GR80201427B



5 200309 887028 >