



**Aliette**  
80 WG

**Ο.Ψ.Υ.**= Όγκος ψεκ. υγρού **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.**= Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες

**Αλιέτ 80 WG**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το fosetyl-Al, ανήκει στις φωσφονικές ενώσεις και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των спорίων ή την ανάπτυξη του μυκηλίου και το σχηματισμό των спорίων. Χάρη στη διασυστηματική δράση του (κινείται ανοδικά και καθοδικά), το Aliette 80 WG επιτυγχάνει τη διέγερση των φυσικών αμυνών του φυτού και δρα αποτελεσματικά κατά Ωμοκυττών (Περονόσπορος, Φυτόφθορα), καθώς και κατά ασθενειών που προκαλούνται από βακτήρια, όπως το Βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora*) και προσβολές από *Pseudomonas syringae*.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί φυλλώματος

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε αναδειύοντας στο ψεκαστικό την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, και συμπληρώστε με νερό αναδειύοντας συνεχώς.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --**

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:**

**Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρούτ:** Φυτόφθορα (*Phytophthora sp.*)

Α. Ένας ψεκασμός το μήνα αρχίζοντας από το φρούσκωμα των οφθαλμών και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (200-600 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-200 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/30. Β. Εφαρμογή στο φυτώριο/σπορέο. **Δόση:** 400 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (500 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 125 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/60. Γ. Εφαρμογή με επέλιψη. **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (2,5 γρ. σκευάσματος/λίτρο). **Ο.Ψ.Υ.:** Μ.Α.Ε/Μ.Ε.: 1.

**Μηλιά, Αχλαδιά: Φυζικήλαδίο (*Venturia inaequalis*).** Προληπτικοί ψεκασμοί αρχίζοντας πριν από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περίπου το 70% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 54-77). **Δόση:** 150-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (150-375 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/7-12.

**Μηλιά, Αχλαδιά: Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (*Phytophthora cactorum*).** Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-375 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/30.

**Μηλιά, Κυδωνιά: Βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora*).** Προληπτικοί ψεκασμοί λίγο μετά από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περισσότερο από το μισό του τελικού τους μεγέθους (Μηλιά: BBCH 61-75, Κυδωνιά: BBCH 53-75). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-375 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/7.

**Αχλαδιά: Στεμφύλιο (*Stemphylium sp.*), Βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora*), Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*).**

Α. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83). **Δόση:** 50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-75 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-5/7. Β. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-375 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/7.

**Ακτινιδιά: Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (*Phytophthora sp.*)** Ψεκασμοί φυλλώματος αρχίζοντας στο τέλος της πτώσης των πετάλων και μέχρι σχεδόν όλοι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 69-79). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375-500 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 150-200 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/30.

**Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο): Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*).** Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο των 5 φύλλων έως το «κλείσιμο» του τσαμπιού (BBCH 15-79). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-4/7-12.

**Φράουλα (Y+Θ): Σήψηες λαιμού και ριζών (*Phytophthora sp., Phytophthora cactorum, Phytophthora fragariae*).** Α. Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59). **Δόση:** 250 γρ./100

λίτρα ψεκ. υγρού (250 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-3/8-10. Β. Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση. **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Ο.Ψ.Υ.:** 10 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1/-

**Τομάτα (Y+Θ), Μελιτζάνα (Y+Θ): Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*).** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (200-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-3/8-10.

**Αγγούρι (Y+Θ), Κολοκύθι/Κολοκυθάκι (Y+Θ): Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*).** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (160-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 80-100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-3/8-10.

**Πεπόνι (Y+Θ), Καρπούζι (Y+Θ), Κολοκύθα (Y+Θ): Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*).** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (160-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 80-100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-3/8-10.

**Μαρούλι (Y+Θ): Περονόσπορος (*Bremia lactucae*).** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-45). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-3/10-14.

**Αγκινάρα: Περονόσπορος (*Bremia lactucae*).** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-45). **Δόση:** 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (200 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/10-14.

**Φυτάρια Δένδρων (εκτός εσπεριδοειδών): Φυτόφθορα (*Phytophthora sp.*)** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-120 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-3/30.

**Καλλιπαστικά<sup>1</sup> (Y&Θ): Φυτόφθορα (*Phytophthora sp.*)** Α. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-120 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-3/30. Β. Ριζοπάτσια. **Δόση:** 5-10 γρ./Τετρ. μέτρο. **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/30.

**Σπανάκι: Περονόσπορος (*Bremia lactucae*).** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας (BBCH 14-45). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-3/10.

**Ακρόδρυα<sup>2</sup>: Αμυγδαλιά<sup>2</sup>, Φιστικιά<sup>2</sup>, Φουντουκιά<sup>2</sup>, Καρυδιά<sup>2</sup>, Καστανιά<sup>2</sup> (Χρήσιες Ήσσονος Σημσίας): Φυτόφθορα (*Phytophthora sp.*), Βακτηρίαση καρυδιάς (*Xanthomonas campestris pv. Juglandis*), Μελάνωση Καστανιάς (*Phytophthora cambivora*).** Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές μέχρι πριν το σχηματισμό του εδάφιμου καρπού (BBCH 65). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-375 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-2/30.

**Αβokάντο<sup>2</sup> (Χρήση Ήσσονος Σημσίας): Φυτόφθορα (*Phytophthora cinnamomi*).** Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι το στάδιο όπου σχεδόν όλοι οι καρποί έχουν σπάσει στο τελικό τους μέγεθος. (BBCH 51-79). **Δόση:** 250-300 γρ./στρ. **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε.:** 1-3/14.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**  
<sup>1</sup> Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.  
<sup>2</sup> «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιεργίες Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά και Αβokάντο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**  
**Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι/Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα:** 3 ημέρες.  
**Φράουλα (ψεκασμός φυλλώματος), Αβokάντο:** 14 ημέρες.  
**Φράουλα (εμβάπτιση ριζώματος):** -  
**Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ), Μαρούλι, Σπανάκι:** 15 ημέρες.

**Αγκινάρα:** 21 ημέρες.  
**Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο):** 28 ημέρες.  
**Ακτινιδιά, Φυτάρια Δένδρων (εκτός εσπεριδοειδών):** 40 ημέρες.

**Καλλιπαστικά:** -  
**Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά):** Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.



**Aliette**  
80 WG

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: - ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιεργίες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με σκισίμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναπο- τίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:** Βλέπε συσκευασία.



Bayer Ελλάς ABEE  
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας  
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6166000  
Fax: 210 6109100  
www.cropscience.bayer.gr



100 gr e

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά  
YAAT: 60858/22.05.2019

**Βρέξιμοι κόκκοι (WG)**

Εγγυημένη σύνθεση: fosetyl - Al 80% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 16,67% β/β

**ΠΡΟΣΟΧΗ**




**Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο**  
με προστατευτική και  
θεραπευτική δράση

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**  
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**  
• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιεργία μετά τον ψεκασμό να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE  
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**  
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.



**Aliette**  
80 WG

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

Σε περίπτωση απύλετου ή αν αισθανθείτε οδοντοαλγία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την επίστα. • Σε περίπτωση εσπινθής: μετακινήστε στον καθαρό αέρα.

• Σε περίπτωση εσπινθής με το δόμα: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχουν με ροληθylene glycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. • Σε περίπτωση εσπινθής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό.



Θεραπεία του ματιού από οφθαλμιατρο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. • Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Κρατήστε τον ασθενή ξυπόλητο και σε ηρεμία.

**Πληροφορίες για το Παρά:** Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόλυση. Παρόλα αυτά, εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (περισσότερη από μία γουλιό) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θεϊκό Νάτριο.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-7793777.

Όσλη/Εκπαιθτική ουσία/Επείγει #24/7  
Όσοι κινδύνους: 800 1135 335  
Όσο κινδύνους: 210 6166 332



5 200309 895689 >  
GR84110396C