



300 κ.εκ. ε

Αρ. Έγκρ. Κωδ. Υ.Α.Α.Τ.: 60.321/315.2012

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
 Εγγ. Σύνθεση: Δραστικές ουσίες:
 fluopicolide: 6,25% β/ο
 propanoic acid hydrochloride: 62,5% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 34,18% β/β

Μυκητοκτόνο
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης,
 Υπεύθυνος για την τελική
 συσκευασία και σήμανση:
 Bayer Ελλάς ABEE
 Σωφρών 18-20, 15125 Μαρούσι
 Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 610910

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



Βολύμε 687,5 SC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση των παρασίτων που παράσιτουν στη Παιτάδα, στο Αγγύρι, στο Κολοκύνθη, στη Κολοκύνθη, στο Πατάκι, στο Καρπούζι, στο Μαρουλί (εργασιμή), στο Λαχανό, στο Μηρόλιθο και στο Κουνουπίδι. Το fluopicolide είναι ένα νέαν εμπόνη που δε δραστική δράση και αποδοτική κίνηση αόλη σε μια νέα χημική ομάδα (φουλοπικολίδες) και όρα σε πολλά στάδια του βιολογικού κύκλου του παρασίτου. Το propanoic acid hydrochloride παραρτάει μική δραστικότητα κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυττάρων μεμβράνων με ανόηση των παραμόδοι της μηχανικής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βίωσης των σπορίων του παρασίτου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Φυσιολογικός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΙΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του φυσιολογικού με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναλόγως την απαιτούμενη δόση του φεσιολογικού. Συμπληρώνουμε με το σπαστικό νερό ανάλογως αναλόγως.

ΦΑΡΜΑΚΟΔΡΑΣΗ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΙΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΤΕΠΙΣΤΟ ΑΡΘΡΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΡΑΒΥΣΗΣ:

Πατάκι: Περίοδος: (Ρυθμιστική Περίοδος) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Τριπλή/τέτραπλη εφαρμογή. Η μική δόση να χρησιμοποιείται σε ανώτερης/χαμηλότερης ποσότητας: 800/21-81. Δόση: 120-160 κ.εκ/στρέμμα (120-160 κ.εκ/100 λίτρα φεσ. υγρού). Όγκος φυσιολογικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επιβράβυσης: 4/1-2.

Αγγύρι, Κολοκύνθη, Κολοκύνθη (αποβλάστηση): Περίοδος: (Ρυθμιστική Περίοδος) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Η μική δόση να χρησιμοποιείται σε ανώτερης/χαμηλότερης ποσότητας: 800/21-81. Δόση: 120-160 κ.εκ/στρέμμα (120-160 κ.εκ/100 λίτρα φεσ. υγρού). Όγκος φυσιολογικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επιβράβυσης: 2/1-2.

Αγγύρι, Κολοκύνθη (εργασιμή): Περίοδος: (Ρυθμιστική Περίοδος) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Η μική δόση να χρησιμοποιείται σε ανώτερης/χαμηλότερης ποσότητας: 800/21-81. Δόση: 120-160 κ.εκ/στρέμμα (120-160 κ.εκ/100 λίτρα φεσ. υγρού). Όγκος φυσιολογικού υγρού: 100-125 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επιβράβυσης: 3/1-2.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟΤΗΤΑΣ: • Πιλά τοξικά για τον ανθρώπινο οργανισμό με μακροχρόνια επιπτώσεις. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Μιακό από παιδιά. • Εφαρμόστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα. • Μην τρώτε, μην πιείτε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφευχθεί η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικό γάντι/προστατευτικό ενδυμασία/σπαστική προστασία για το μάτι/προστασία. • Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • Φυλάσσετε κλειδωμένο. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Να μην πιλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα). Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λυόμενες επιφανείες και τους δρόμους. • Συστηματικά η χρήση να φοράτε οδοντοπροστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. • Να μην εισπνεύσετε στους φεσιολογικούς αερούς πριν το φύλλο να έχουν πλήρως στεγνώσει. Σε περίπτωση που ερήσει γερασμένο ή αναλόγως στους φεσιολογικούς αερούς κινδύνος μετά τον φεσιολογικό αυτό θα πρέπει να φορέσει προστατευτική ενδυμασία.

ΠΡΑΤΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πρώτες βοήθειες
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον (αυτό και σε νεφάλα). Εάν το αναπνευστικό επιμένει, καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα ρούχωνά με το φεσιολογικό υγρό/αυτή μεμέλα και πιλέστε καλά το προσβεβλημένο μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν το αναπνευστικό επιμένει, καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Απομακρύνετε τους φακούς επαφής και πιλέστε τα μάτια μεμέλα με αφέριο νερό και κίμα από το βλεφάρω για τουλάχιστον 15 λεπτά. Προστατέψτε τον υγιή οφθαλμό. Ζητήστε αμεση συμβουλή στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπνεύσει. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσει εμετό. Στείλτε το στόμα να ξεπλυθεί αερώ από άδεια. Καλέστε μεμέλα γιατρό. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Συμπτώματα: Γάργαλα, σπάζα, αυτιά, σπασμοί. Κίνδυνος: Το αναπνευστικό προϊόν, παρόλο που είναι καρδιοτοξικό, δεν είναι τοξικό για τη χημειοθεραπεία. Θεραπεία: Αμεση θεραπεία αναπνευστική. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Αντιδοτό: Αποφύγετε. Συμβουλή: Δεν υπάρχει γαστροπρωστατευτική. Εάν καταλάβει φρεση προστάσει αναλόγως (προστατέψτε από μόνιμο/μυλό) χρησιμοποιήστε αερώ από άδεια και θετικό ήπατο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-793777

Πατάκι, Καρπούζι (αποβλάστηση): Περίοδος: (Ρυθμιστική Περίοδος) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 800/21-81. Δόση: 140-160 κ.εκ/στρέμμα (140-160 κ.εκ/100 λίτρα φεσ. υγρού). Όγκος φυσιολογικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επιβράβυσης: 2/1-2.

Πατάκι, Καρπούζι (εργασιμή): Περίοδος: (Ρυθμιστική Περίοδος) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 800/21-81. Δόση: 140-160 κ.εκ/στρέμμα (140-160 κ.εκ/100 λίτρα φεσ. υγρού). Όγκος φυσιολογικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επιβράβυσης: 3/1-2.

Μαρούλι (αποβλάστηση) (ποικιλίες στραγγιλωτά μαρούλια): Περίοδος: (Βιολογική) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή/μετά το τρίτο προλαμμένο

φύλλο (800/21-81). Δόση: 140-160 κ.εκ/στρέμμα (140-160 κ.εκ/100 λίτρα φεσ. υγρού). Όγκος φυσιολογικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επιβράβυσης: 1-2.

Μαρούλι (εργασιμή) (ποικιλίες στραγγιλωτά μαρούλια): Περίοδος: (Βιολογική) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 800/21-81. Δόση: 140-160 κ.εκ/στρέμμα (140-160 κ.εκ/100 λίτρα φεσ. υγρού). Όγκος φυσιολογικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επιβράβυσης: 1-2/1-2.

Λαχανό λευκό, Λαχανό κόκκινο (αποβλάστηση): Περίοδος: (Ρυθμιστική Περίοδος) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 800/21-81. Δόση: 160 κ.εκ/στρέμμα (160 κ.εκ/100 λίτρα φεσ. υγρού). Όγκος φυσιολογικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επιβράβυσης: 3/1-2.

Κουνουπίδι, Μηρόλιθο (Περίοδος: (Ρυθμιστική Περίοδος) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 800/21-81. Δόση: 160 κ.εκ/στρέμμα (160 κ.εκ/100 λίτρα φεσ. υγρού). Όγκος φυσιολογικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επιβράβυσης: 1-3/1-2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η δόση των 120 κ.εκ/στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά ενώ δόση των 160 κ.εκ/στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά σε περίπτωση που ο κίνδυνος εμφάνισης της προσβολής είναι υψηλότερος ή θερμοκρασία στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης της προσβολής > 27 ο οποίος νεφάρα μόνιμο/μυλό των 100 λίτρα/στρ. πιλέστε δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 160 κ.εκ/στρ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΥΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ: Αγγύρι (εργασιμή), Κολοκύνθη (εργασιμή): 1 γέμα. Αγγύρι (αποβλάστηση), Κολοκύνθη (αποβλάστηση), Κολοκύνθη (αποβλάστηση), Πατάκι (αποβλάστηση και εργασιμή), Καρπούζι (αποβλάστηση και εργασιμή): 3 γέμα. Πατάκι, Μαρούλι (αποβλάστηση) (ποικιλίες στραγγιλωτά μαρούλια): 7 γέμα. Λαχανό λευκό (αποβλάστηση), Λαχανό κόκκινο (αποβλάστηση), Μηρόλιθο (αποβλάστηση), Κουνουπίδι (αποβλάστηση), Μαρούλι (εργασιμή) (ποικιλίες στραγγιλωτά μαρούλια): 14 γέμα.

ΕΙΣΑΓΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΤΥΠΕΣ Η ΠΕΡΙΒΑΤΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΗ ΟΠΙΟΤΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΘΕΙ: Το προϊόν να μην εφαρμόζεται σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση και αμυδρή έδρα. Προκειμένου να παραπονο ο κίνδυνος ανάπτυξης αναδόχων των παρασίτων στο Volare 687,5 SC αναπόσπαστο α εφαρμογής να γίνεται σε αναλόγως μικρότερα ή/και αυτών αναδοχών τρόπο δράσης με το οποίο δεν εφαρμόζεται διαδοχικά/αποδοχών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό σε αναλόγως καλλιεργές να δόσει εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΡΕΦΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΤΡΟΠΟΤΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το νεφάρο αναλόγως/επιμένει να υποπίπτει με κατάλληλο μηχανισμό ή μέσο από εξοπλισμό που νεφάρα το εξοπλισμό το αόνημα στο φεσιολογικό υγρό και στη συνέχεια αφού καταπονο προληπτικές μέτρα για τη διασφάλιση της μη παραρταμένης χρήσης, αποσπασθεί σε σημείο αλλοιόγως να αόνηση ελεύθερα.

Η απόσπασση ή καταπονοση του αναδοχών πρέπει να γίνεται σε μηχανισμούς που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταπονοση του.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΟΣ: Το αναδοχών παραμένει σταθερό για περί 3 μήνα τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία ή αναδοχών σε χώρο ήπια, προστασμένο και καλά αεραζόμενο.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. - ΑΡ. ΠΑΡΤΑΒΑΣ: Βλέπε αναλόγως φύλλο.

Γεωτεχνικό έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
 από σπαστικό: 800 1135 353
 από κεντρικό: 210 6166 332

GR80226977D



Bayer
 Διανομέας: Bayer Ελλάς ABEE
 Σωφρών 18-20
 151 25 Μαρούσι
 Τηλ: 210 6166000
 Fax: 210 6109100
 www.bayercropscience.gr



400

300

200

100