



FLINT 50 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο με κυρίως προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση. Εμφανίζει διασυστημική και τοπική διασυστημική κίνηση καθώς και αξιόλογη δράση με σπυρίδι. Η δράση της ουσίας τριφλοξστοβιν είναι παρεμπιπτόντως της μυκητοδραστικής αντανόης των μυκήτων στη θέση Qo του συμπλόκου III του κυτοχρώματος bc 1 (ομάδα Qo1, υποομάδα oximinoacetates).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Σε περίπτωση μεγάλων βυτίου, βάλτε το Flint 50 WG πρώτα και συνεχίστε με το υπόλοιπο σκευάματος, αναδεύοντας συνεχώς.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΔΡΗΣΙΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ):

ΑΜΠΕΛΙ (Ονοποισήμες ποικιλίες, Επιτραπέζιες ποικιλίες, Σταφίδα): **Ωίδιο** (*Uvula necator*). Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο μήκους βλαστού 10 εκ. μέχρι το κλείσιμο της σταφύλης. Το προϊόν εμφανίζει δευτερεύουσα δράση εναντίον του περονόσπορου (*Plasmopara viticola*) (BBCH 14-79). **Δόση:** 12,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 3/10-14 ημέρες.
ΜΗΛΙΑ: **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*). **Δόση:** 7,5-10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-10 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*). **Δόση:** 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι μέγιστος καρπού ημίσειας του τελικού. Για το φουζικλάδιο και το ωίδιο θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προεδοποιήσεις (BBCH 09-75). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 3/10-12 ημέρες.
ΑΧΛΑΔΙΑ: **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*). **Δόση:** 7,5-10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-10 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*). **Δόση:** 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10-15 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού**

υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Σταφυλίω (*Stemphylium spp.*). **Δόση:** 15 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (15 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.
Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι μέγιστος καρπού ημίσειας του τελικού. Για το φουζικλάδιο και το ωίδιο θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προεδοποιήσεις (BBCH 09-75). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 3/10-12 ημέρες.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: **Ωίδιο** (*Sphaerotheca pannosa*). Από την πτώση των πετάλων μέχρι το μέγιστος του καρπού να φθάσει το 90% τελικού μεγέθους (BBCH 69-79). **Δόση:** 15 γρ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 3/10-14 ημέρες.
ΕΛΙΑ: **Κυκλοκόνιο** (*Oryzarium oleaginum*). **Γλοισπόριο*** (*Colletotrichum gloeosporioides*, *Colletotrichum acutatum*, *Colletotrichum clavatum*). Από το στάδιο όπου οι βλαστοί φθάνουν το 70% του τελικού μεγέθους μέχρι και το στάδιο όπου ο καρπός αποκτάει ανοχτό πράσινο-κίτρινο χρώμα (BBCH 37-79). **Δόση:** 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10-15 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 2 / Μόνο 1 ερασιμνή επιβεβαιωμένα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.
ΤΟΜΑΤΑ (Θ): **Ωίδιο** (*Leveillula taurica*). Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) (BBCH 21-89). **Δόση:** 12,5 γρ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 3/10-14 ημέρες.
ΠΕΠΟΝΙ (Α, Θ): **Ωίδιο** (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*). Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) (BBCH 21-89). **Δόση:** 12,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού, 25** γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)), 25** γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 3/10-14 ημέρες.
ΡΥΖΙ: **Καφέ κηλίωση φύλλων** (*Bipolaris sp.*). **Πυρκαυλάκια** (*Pyricularia oryzae*). Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) από την έναρξη επιμήκυνσης του στέλεχος έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-61). **Δόση:** 25 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-60 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 1/-

Παρατηρήσεις:

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη χρήση στο γλοισπόριο της ελιάς, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανή αποτυχία.

**Στο πεπόνι προτείνεται η εφαρμογή της μεγαλύτερης δόσης των 25 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης προσβολής και για μεγαλύτερα μεσοδιάστημα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: **Αμπέλι** (Ονοποισήμες ποικιλίες, Επιτραπέζιες ποικιλίες, Σταφίδα): **Ρύζι:** 28 ημέρες, **Μήλα, Αχλάδια, Ελιά:** 14 ημέρες, **Ροδάκινά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά:** 7 ημέρες.

Τομάτα, Πεπόνι: 3 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΤΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
• Εφαρμόστε το Flint 50 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενών και απορρίψτε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
• Εφαρμόστε το Flint 50 WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους Qo1s με τα οποία δεν εμφανίζε διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιεργείες και στις συνιστώμενες δόσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προληπτικά, με τρίψιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα ενσωματωθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.



5 200309 894422



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr



10x25 gr e

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά Y.A.A.T.: 6955 / 30-4-2004

Εναιωρηματοποιησμοί κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεση: Trifloxystrobin 50,0% β/β,

Βοηθ. ουσίες: 47,9% β/β

Μυκητοκτόνο

με κυρίως προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της άδειας Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

GR80247540F

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Απομακρωθείτε από την επεξεργασμένη περιοχή. Αεραρώστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. **Σε περίπτωση ασπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση εσπώης με το δέρμα:** Πλύνετε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethylenglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε Επισκεφτείτε γιατρό.

• Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση εσπώης με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλεφάρια, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς εσπώης (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Πληροφορίες για το προϊόν:

Θεραπεία: Σε περίπτωση κατάποσης η πλήρη σιελόγχο πρέπει να ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Παρ' όλα αυτά, η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θεικού καρβίου ανιστάται πάντα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Εφοδιστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Αποφύγετε να αντανέστε σκόνη. • Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφευχθεί η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μάσκα σωματικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και καταλήδες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Διάθεση του περιεχομένου/περιεχόμενου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απεχαστή ζώνη προστασίας 20 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και 5 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού από τα επανακινεία ύδατα. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε Επισκεφτείτε γιατρό. • Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.