



ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μυκητοκτόνο με διασυστηματική δράση κατά των περονόσπορων και της αλτερνάριας σε πατάτα και τομάτα.

Το ipronalincarb (ομάδα αμιδο-καρβαμιδικών εστέρων) δρα εξειδικευμένα κυρίως εναντίον μυκήτων της τάξης Peronosporales της κλάσης των Ωομυκήτων. Γενικά το ipronalincarb θεωρείται ότι εμφανίζει αξιόλογη προληπτική κυρίως δράση αλλά και ικανοποιητική θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση απορροφάται ταχέως από το φύλλωμα και κινείται μέσα στο φυτό με αποπ्लाστική κυρίως κίνηση. Το rprolineb ανήκει στη χημική ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα μονοαλκυλοδιθειοκαρβαμιδικά. Η δράση του είναι προστατευτική.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΕΧΘΡΟΣ - ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΣΚΕΥΑΣΜΑ) - ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ - ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πατάτα
Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*) - Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*). **Δόση εφαρμογής:** 250-300γρ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνονται προληπτικοί ψεκαμοί, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.

Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/περίοδο: 2-3. **Τομάτα (Υπαίθρου - Θερμοκηπίου)**

Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*) - Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*). **Δόση εφαρμογής:** 250 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα (Υπαίθρου), 100-120 λίτρα/στρέμμα (Θερμοκηπίου). Συστήνονται προληπτικοί ψεκαμοί, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.

Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/περίοδο: 2-3. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ):**

• **Πατάτα:** 14 ημέρες • **Τομάτα Υπαίθρου:** 20 ημέρες • **Τομάτα Θερμοκηπίου:** 7 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και τη ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά τον ψεκασμό να γίνεται πλύσιμο των ψεκαστικών μέσων με νερό. Να γίνονται, τουλάχιστον, 3 ξεπλύματα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ

Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Χρήση του Melody Duo μόνο προληπτικά και κατά προτίμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. • Σε περιοχές που εφαρμόζονται μέχρι 6 επεμβάσεις για τον περονόσπορο, οι μισές μπορεί να είναι με Melody Duo, ενώ όπου εφαρμόζονται περισσότερες το ένα τρίτο να είναι με Melody Duo. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: 2-3 • Σε περίπτωση εφαρμογής 2 συνεχόμενων επεμβάσεων με Melody Duo η επόμενη να γίνεται μετά από εφαρμογή 2 τουλάχιστον επεμβάσεων με σκευάσματα που δεν περιέχουν ipronalincarb και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με ipronalincarb • Σε περίπτωση εναλλαγής με μυκητοκτόνο άλλης ομάδας πρέπει να τηρείται το μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του Melody Duo είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική του κλειστή συσκευασία. Το σκεύασμα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε στο καπάκι του κυτίου. **ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:** Βλέπε εσωτερική σακούλα.



2,5 kg e

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας
Υ.Α.Α.Τ.:
6954/29.04.2004

Βρέξιμη σκόνη (WP)
Εγγυημένη σύνθεση: propineb: 61,3% β/β+ ipronalincarb: 5,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 26,85% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μυκητοκτόνο
με διασυστηματική δράση κατά των περονόσπορων και της αλτερνάριας σε πατάτα και τομάτα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης,
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση εισπνοής ή σε περίπτωση κατάποσης.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
- Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Φυλάσσετε κλειδωμένο.
- Μην μιλάνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Η εφαρμογή του να γίνεται με αυτόματο σύστημα ψεκασμού και σε περίπτωση έλλειψής αυτού να τηρούνται αυστηρά μέτρα προστασίας.


ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- Μετακινήστε τον ασθενή μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και μεταφέρετέ τον σε σταθερή πλάγια θέση.
- Απομακρύνετε τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε καλά το δέρμα που ήρθε σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό με αρκετή ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε καλά τα μάτια με νερό για αρκετή ώρα.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επίστρε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.
Εφαρμοστέ συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Bayer
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr



GR80265662B

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer **24/7**
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**