



Luna[®]

EXPERIENCE

500ml e

ΑΑΔΑ Υ.Α.Α.Τ.
60.353 - 13/3/2013

LUNA EXPERIENCE SC

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: fluopyram 20% β/ο, tebuconazole 20% β/ο,

Βοηθητικές ουσίες: 62,93% β/β

Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Κάτοχος της άδειας,
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



400

300

200

100

Λούνα Εξπέριενς SC

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το μυκητοκτόνο Luna Experience SC είναι μίγμα της νέας δραστηρικής ουσίας fluoxyzolam και του tebuconazole.

Το fluoxyzolam παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate Dehydrogenase (σύνπλοκο II - παρεμποδιστής SDH). Το fluoxyzolam δρά παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου.

Το tebuconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιόμυκητες Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρά παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors- DMIs).

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): Ωίδιο (*Uncinula necator*). Εφαρμογές από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων μέχρι πριν την πλήρη ωρίμανση. **Δόση:** 30-40 κεκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (12-40 κεκ. / στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-100 λίτρα/στρέμμα.

Μηλιά - Αχλαδιά: Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*) Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*), Στεμφύλιο (*Stemphylium vesicarium*), Αλτερνάρια (*Alternaria spp.*) Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. **Δόση:** 40-50 κεκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (20-75 κεκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα.

Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερσαιά: Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κεκ./στρέμμα. **Φαιά σήψη (*Monilia spp.*):** **Δόση:** 42-50 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (63-75 κεκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*):** **Δόση:** 33,5 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (49,5 κεκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα.

Σπαράγγι: Σκωρίωση (*Puccinia asparagi*). Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή στην ανεπτυγμένη υπέργεια βλάστηση. **Δόση:** 75 κεκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Κρεμμύδι - Σκόρδο (υπαίθρου): Σκωρίωση (*Puccinia allii*), Στεμφύλιο (*Stemphylium sp.*) Εφαρμογές από το στάδιο της διάκωσης της βόσσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχωματισμού του υπέργειου μέρους. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό σε μικρή έως μέτρια προσβολή. **Δόση:** 60-100 κεκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-80 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 3/12-14

Μηλιά - Αχλαδιά: 2/7-10

Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερσαιά: Φαιά σήψη (*Monilia spp.*): 2/7-14, Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*): 3/14

Σπαράγγι: 2/10-14

Κρεμμύδι - Σκόρδο (υπαίθρου): 1/-

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14 ημέρες

Μηλιά - Αχλαδιά: 14 ημέρες

Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερσαιά: 3 ημέρες

Σπαράγγι: -

Κρεμμύδι - Σκόρδο: 7 ημέρες

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-Σπορά ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -

-Σπορά ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Ως ακόλουθες καλλιέργειες να μην φυτεύονται δενδρώδεις καλλιέργειες και λαχανικά.

-Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέρχονται στις περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια εκτός αν φορούν προστατευτική ενδυμασία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχόλιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία μέχρι 40° C.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες Βοήθειες

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Γενικά: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επεμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethylene glycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα.

Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική.

Συνθήκες δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

24/7

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Μακριά από παιδιά • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην αναπνέετε εκνεφώματα. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Φορέστε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή. • Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. • Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων 50% μειωμένης διασποράς ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς.

Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18 - 20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr



GR80505515B



5 200309 889770 >



Luna[®]

EXPERIENCE

500ml e

ΑΑΔΑ Υ.Α.Α.Τ.:
60.353 - 13/3/2013

LUNA EXPERIENCE SC

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: fluopyram 20% β/ο, tebuconazole 20% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: 62,93% β/β

Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Κάτοχος της άδειας,
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100