

FLINT® PLUS  
64WG



FLINT® PLUS  
64WG

1,5 Κιλό e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:  
60312 / 28-12-2011

**Βρέξιμοι κόκκοι (WG)**

Εγγ. Σύνθεση: Δραστικές ουσίες:  
Captan 60% β/β, Trifloxystrobin 4% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 30% β/β

# Μυκητοκτόνο

για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,  
της μηλιάς και του στεμφύλιου  
του αχλαδιού και της κυδωνιάς.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική  
συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι  
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

BayWin  
Πρόγραμμα Επιβράβευσης

BONUS  
STICKER

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ



### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Υποπνο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Περιέχει captan και trifloxystrobin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Αποφεύγετε να αναπνεύσετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφιέρσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Πρώτες βοήθειες:  
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

• Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Γενικά:** Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό και απομακρύνετε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε τον παθόντα από την ρυπαρή περιοχή στον καθαρό αέρα και εξασφαλίστε του τις βασικές ζωτικές λειτουργίες. Τοποθετήστε τον σε σταθερή πλάγια θέση. Καλέστε γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία και τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε επιμελώς το δέρμα με άφθονο σαπούνι και νερό (ή polyethylenglycol 400 εάν είναι διαθέσιμο). Ξεπλύνετε στη συνέχεια με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία:** Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας του προϊόντος, συνιστάται πλύση στομάχου ή χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



FLINT® PLUS  
64WG



FLINT® PLUS  
64WG



FLINT® PLUS  
64WG



### ΦΛΙΝΤ ΠΛΑΣ 64WG

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
Το Flint Plus είναι μυκητοκτόνο, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου της μηλιάς και του φουζικλαδίου, του αχλαδιού και του στεμφύλιου της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Το Trifloxystrobin, είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρινών με διελασματοική δράση. Οι στρομπιλουρινές παρεμποδίζουν τη μιτοχονδριακή αναπνοή, διακόπτοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην κυτοχρωμική αλυσίδα.

Το captan έχει δράση ως μυκητοκτόνο επαφής. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι το ένα τρίτο (1/3) με νερό. Διαλύστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**  
**ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**  
**Αχλαδιά, Κυδωνιά**

Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*): Δόση: 150 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (150 γρ./στρέμμα).  
**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.  
Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*): Δόση: 125 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (125 γρ./στρέμμα).  
**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.  
Στεμφύλιο (*Stemphylium spp.*): Δόση: 187 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (187 γρ./στρέμμα).  
**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.  
Προληπτικές εφαρμογές λίγο πριν ή κατά την έναρξη της προσβολής (βλάστηση σπορίων παθογόνου), από το στάδιο της λευκής κορυφής και κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημερών\*.

**Μηλιά**  
Ωίδιο\*\* (*Podosphaera leucotricha*), Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*): Δόση: 150 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (150 γρ./στρέμμα).  
**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.  
Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*): Δόση: 125 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (125 γρ./στρέμμα).  
**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.  
Προληπτικές εφαρμογές λίγο πριν ή κατά την έναρξη της προσβολής (βλάστηση σπορίων παθογόνου), από το στάδιο της λευκής κορυφής και κατόπιν

σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημερών\*.

### Παρατηρήσεις:

\*) Σε περίπτωση εφαρμογής για την αντιμετώπιση μόνο του φουζικλαδίου ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 2 με μεσοδιάστημα 8 ημερών.

\*\*) Στην καλλιέργεια της μηλιάς να χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του Ωιδίου μόνο σε περίπτωση ταυτόχρονης καταπολέμησης και του φουζικλαδίου. Για την καταπολέμηση αποκλειστικά του Ωιδίου στην μηλιά να προτιμούνται άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

**Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά:** 35 ημέρες  
**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

• Το Flint Plus δεν κινδυνεύει από έκπλυση τρεις (3) ώρες μετά την εφαρμογή. Ανανεώστε την εφαρμογή μετά από βροχοπτώση πέραν των 40 χιλιοστών ή χιονόπτωσης.  
• Ο ψεκασμός με Flint Plus να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έναρξη της προσβολής (βλάστηση σπορίων του παθογόνου) ή πριν από αυτή (αυστηρά προληπτική εφαρμογή) και κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιούμε την προστασία και τις πιθανότητες να φτάσουμε στο τέλος της περιόδου πρωτογενών μολύνσεων με ικανοποιητικό αποτέλεσμα.  
• Συμβουλευτείτε τις τοπικές και επίσημες πηγές πληροφόρησης ώστε να λάβετε γνώση των περιόδων υψηλού κινδύνου. Το Flint Plus είναι αποτελεσματικό οποιοδήποτε και αν είναι το επίπεδο ευαισθησίας των πληθυσμών φουζικλαδίου, οι οποίοι είναι παρόντες στον οπωρώνα κατά τον ψεκασμό.

• Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εντάσσεται το Flint Plus σε πρόγραμμα φυτοπροστασίας σε εναλλαγή με άλλα σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετικών χημικών ομάδων).  
• Να μην εφαρμόζεται με επινώτιο ψεκαστήρα λόγω ανομοιομορφίας του ψεκασμού.  
• Το Flint Plus είναι ουδέτερο έως ελαφρά τοξικό επί του *Typhlodromus pyri* και του *Kampyodromus aberrans* (IOBC 1-2).

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** 48 ώρες

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:**  
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Η απόσυρση/καταστροφή του Flint Plus πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, σε μέρος δροσερό και αεριζόμενο, σε κλειδωμένο χώρο, σε θερμοκρασία από -20° C έως +40° C, μακριά από παιδιά και χωριστά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης:** Βλέπε άνω μέρος κυτίου.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7  
από σταθερό: **800 1135 353**  
από κινητό: **210 6166 332**

GR050839B



Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20  
151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6166000  
Fax: 210 6109100  
www.bayercropscience.gr



5 200309 816882 >