Pasadoble®

ΠΑΣΑΝΤΟΜΠΛΕ 70 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του περονόσπορου, της φόμοψης και της μέλαινας σήψης στο Αμπέλι.
Το fluopicolide είναι ένα νέο μυκητοκτόνο και ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα (acylpicolides). Παρέχει ένα σταθερά υψηλό επίπεδο προστατευτικής δράσης. Επιπλέον έχει αντισπορογόνο δράση και δυνατότητες θεραπευτικής δράσης. Το fluopicolide έχει διελαισματική δράση και μετακινείται στο φυτό μέσω των αγγείων του ξύλου (ακροπέταλη διαουστηματική κίνηση). Δρα εξ επαφής σε πολλά στάδια του βιολογικού κύκλου του περονόσπορου και παρέχει τη βέλτιστη προστασία όταν χρησιμοποιείται πριν την μόλυνση του φυλλώματος. Το propineb ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα μονοαλκυλοδιθειοκαρβαμιδικά. Το propineb είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Δρα σε περισσότερες από μια θέσεις στο υποκυτταρικό επίπεδο των μυκήτων. Επιπλέον το propineb περιέχει στο μόριό του ψευδάργυρο.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Ανακινήστε το σκεύασμα καλά. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ–ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ–ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ–ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο):
Περονόσπορος (*Plasmopara viticola)*, Φόμοψη (*Phomopsis viticola)*, Μέλαινα σήψη (*Guignardia bidwellii)*: Εφαρμογές από το στάδιο των 5 φύλλων του αμπελιού μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης.
Δόση: 200-250 γρ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρό (200 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80-100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/10-12.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): 56 ημέρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθης συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:
Βλέπε άνω μέρος κυτίου.

5 200309 866634 >

Bayer

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000,
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

Pasadoble®

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Πρώτες Βοήθειες
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή σε κάθε περίπτωση ύπαρξης αμφιβολίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Προκαλέστε εμετό μόνο εάν: 1. ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του, 2. δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια άμεσα διαθέσιμη, 3. ικανή ποσότητα (περισσότερο από μία γουλιά) έχει καταποθεί, 4. δεν έχει περάσει περισσότερο από 1 ώρα από τη στιγμή της κατάποσης (σε περίπτωση εμετού αποφύγετε την εισρόφηση του υγρού στην αναπνευστική οδό). Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Συμπτώματα: ναυτία, εμετός, τα συμπτώματα ενισχύονται από την κατανάλωση αλκοόλ (antabuse effect), καταστολή του ΚΝΣ, μυϊκή αδυναμία.
Κίνδυνοι: Αυτό το προϊόν, παρόλο που είναι καρβαμιδικό, δεν είναι αναστολέας της χολινεστεράσης.
Θεραπευτική αγωγή: Συνιστάται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία, όπως υποδεικνύεται από την κατάσταση του ασθενούς. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγείστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Αντένδειξη: Ατροπίνη.
Μέτρα παρακολούθησης: Αυστηρή αποχή από το αλκοόλ για 1 έως 2 εβδομάδες, λόγω του antabuse effect.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer 24/7
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

Pasadoble®

1 Κιλό e

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)
Υ.Α.Α.Τ: 60.389/16-10-2013

Pasadoble 70 WG
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση: fluopicolide 5% β/β, propineb 65% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 23,42% β/β

Μυκητοκτόνο

για την αντιμετώπιση του περονόσπορου,
της φόμοψης και της μέλαινας σήψης στο Αμπέλι

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

GR80928548B

Pasadoble®

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- **Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.**
- **Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.**
- **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**
- **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**
- **Περιέχει hexamethylentetramine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.**

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- **Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.**
- **Μακριά από παιδιά.**
- **Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.**
- **Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.**
- **Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα.**
- **Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**
- **Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.**
- **Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.**
- **Φυλάσσεται κλειδωμένο.**
- **Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**
- **Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**
- **Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 50% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού.**
- **Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**
- **Σε περίπτωση που πρέπει οι εργάτες να εισέλθουν στον ψεκασμένο αγρό αμέσως μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε πουκάμισο με μακριά μανίκια καθώς και μπότες.**