SERENADE® MAX

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Κίνδυνος διασκορπισμού. Να μην εφαρμόζεται ενάντια στην κατεύθυνση του ανέμου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Πρώτες Βοήθειες
• Γενικά: Απομακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου. Εάν αναπτυχθεί ερεθισμός ή άλλο σύμπτωμα, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Κρατήστε τα μάτια ανοικτά και ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. **• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε επιμελώς το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. **• Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν ο ασθενής δεν αναπνέει, καλέστε ασθενοφόρο και κατόπιν εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή **• Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως γιατρό σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας. Χορηγήστε στον ασθενή ένα ποτήρι νερό εάν μπορεί να καταπιεί. Μη χορηγηθεί τίποτα από στόματος σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα: Το σκεύασμα έχει χαμηλή από στόματος και από δέρματος τοξικότητα και αναμένεται να έχει χαμηλή τοξικότητα από εισπνοή Απευθείας επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισμό.
Θεραπεία: Συμπτωματική και υποστηρικτική.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer **24/7**
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

5 200309 882214 >

Bayer
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

SERENADE® MAX

ΣΕΡΕΝΕΪΝΤ ΜΑΞ WP
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το SERENADE MAX είναι ένα σκεύασμα με βάση το στέλεχος του *Bacillus subtilis* QST 713, σε μορφή βρέξιμης σκόνης για την καταπολέμηση του μυκητολογικών προσβολών σε ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών με προληπτικές εφαρμογές.
Το στέλεχος του *Bacillus subtilis* QST 713 παράγει κυρίως λιποπεπτίδια τα οποία ενεργούν στις κυτταρικές μεμβράνες/κυτταρικό τοίχωμα των παθογόνων καταστρέφοντας τα κύτταρά τους. Έτσι παρεμποδίζεται η βλάστηση των σπορίων των μυκήτων, η επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα και η διείσδυσή τους στο φυτικό ιστό. Επιπλέον παράγει ουσίες με αντιβακτηριακή δράση οι οποίες παρεμποδίζουν το σχηματισμό του κυτταρικού τοιχώματος και την παραγωγή πρωτεϊνών στα βακτήρια.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες με κάθετη μπάρα, με ψεκαστήρα επιφανείας ή με ψεκαστήρα πλάτης.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε, αναδεύοντας, τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Ξεπλύνετε το βυτίο με νερό. Δεν απαιτείται ειδικό απορρυπαντικό.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (3) - ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:
Αμπέλι: Βοτρύτης (*Botrytis cinerea*) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και αφού έχει ανθίσει το 80% των ανθέων μέχρι την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (όταν οι καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας τους) **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 14.
Μηλιά, Αχλαδιά (1): Φουζικλάδιο (*Venturia Spp*.) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την πράσινη κορυφή μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν μέγεθος 20 χιλιοστών (mm). **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Βακτηριακό κάψιμο μηλοειδών (*Erwinia amylovora*) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής (κατά τη διάρκεια της άνθισης) ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Φράουλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Βοτρύτης (*Botrytis cinerea*) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την έναρξη της άνθισης και μέχρι τη συγκομιδή **Δόση:** 250-350 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Μαρούλι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Σκληροτίνια (*Sclerotinia spp*.) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων μέχρι και τον πλήρη σχηματισμό της κεφαλής του μαρουλιού **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Νεκταρινιά (2): Φαιά σήψη (*Monilinia spp*.) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο που ο καρπός έχει το μέγεθος καρυδιού μέχρι και τη συγκομιδή. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Βακτηριακό κάψιμο (*Xanthomonas arboricola*) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την πτώση του κάλυκα (τέλος καρποδέσης) μέχρι που καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τελικό τους χρώμα. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Τομάτα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Βοτρύτης (*Botrytis cinerea*) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο της καρποδέσης μέχρι και τη συγκομιδή **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Βακτηριακή κηλίδωση (*Pseudomonas syringae*) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο πριν την άνθιση μέχρι και τη συγκομιδή. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Πιπεριά, Μελιτζάνα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Βοτρύτης (*Botrytis cinerea*) Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο της καρποδέσης μέχρι και τη συγκομιδή **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Ροδιά (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp., Botrytis cinerea*) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρποδέσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 71-89. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Ακτινιδιά (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.), Βακτήριο (*Pseudomonas syringae pv. Actinidiae*PSA)) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρποδέσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 71-89. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.

BAYER

SERENADE® MAX

1 kg e

ΑΑΔΑ Υ.Α.Α.Τ.: 60.382/ 12-9-2013

SERENADE MAX WP

Βρέξιμη σκόνη (WP)
Εγγ. Σύνθεση: *Bacillus subtilis* - strain QST 713* 15.67% β/β
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι το 84.33% β/β

*Το τυποποιημένο σκεύασμα περιέχει 5,13 x 10^{10} CFU/g

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σκεύασμα με βάση το στέλεχος του *Bacillus subtilis* QST 713 με μυκητοκτόνο και αντιβακτηριακή δράση

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 834/07 ΚΑΙ 889/08

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος επικοινωνίας,
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

BAYWIN

BONUS STICKER

GR84116386F

SERENADE® MAX

Αγκινάρα (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 71-89 **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Κρεμμυδάκι χλωρό (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 71-89. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Φασόλι ξερό (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βακτήριο (*Xanthomonas spp., Pseudomonas spp., Pseudomonas syringae*) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση BBCH 71-89. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Μπάμια (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση BBCH 71-89. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Μπρόκολο (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βακτήριο (*Pseudomonas spp*.) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση BBCH 71-89. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Στέβια (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση BBCH 71-89 **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Μύρτιλλο, Σμέουρο (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp, Botrytis cinerea*), Μονίλια (*Monilinia vaccinii-corymbosi*), Βακτηριακό Κάψιμο (*Pseudomonas syringae pv. syringe*), Καρκίνος του Λαιμού (*Agrobacterium tumefaciens*), Βακτηριακό Έλκος (*Gordonia cassandrae, Fusicoccum putrefaciens*) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από την έναρξη της καρποδέσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Συκιά (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.), Ενδοσπήρη από Βακτήρια (*Pseudomonas syringae*), Σκωρίαση (*Cerotelium fici*) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από την πτώση του κάλυκα (τέλος καρποδέσης) μέχρι και τη συγκομιδή **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Αβοκάντο (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από την έναρξη της καρποδέσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Κολοκύθι (αποκλειστικά για την ποικ. Melorepo) (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις από το στάδιο πριν την άνθιση μέχρι και τη συγκομιδή. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Σπανάκι (Υ&Θ), Αντίδι (Υ&Θ), Σταυναγκάθι (Υ&Θ) (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Ρόκα (Υ&Θ) (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.), Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Πράσο (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
ΟΣΠΡΙΑ (Υ & Θ): Αρακάς, Φακή, Κουκιά, Ρεβίθι, (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.), Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae pv. pisi*. *Pseudomonas pisi*). Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.
Καπνός (μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βακτηρίωση (*Pseudomonas tabacina, Pseudomonas sp*.) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.

SERENADE® MAX

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Α.ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Ρίγανη, Σέλινο, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κοριάνδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Μαστίχα Χίου, Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποιία).
Β. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Ρίγανη, Σέλινο, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κοριάνδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποιία). (Μικρής σημασίας χρήση)[4]: Βοτρύτης (*Botrytis spp*.) Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*) Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας/πλήρη ωρίμανση **Δόση:** 250-400 γρ./στρέμμα. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 7.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Αμπέλι: 5
Μηλιά[1], Αχλαδιά[1]: Φουζικλάδιο: 8, **Βακτηριακό κάψιμο μηλοειδών:** 4
Ροδακινιά[2], Βερικοκιά[2], Δαμασκηνιά[2], Κερασιά[2], Νεκταρινιά[2]: 4
Φράουλα (Υ&Θ), Μαρούλι (Υ&Θ), , Τομάτα (Υ&Θ), Πιπεριά (Υ&Θ), Μελιτζάνα (Υ&Θ), Ροδιά, Ακτινιδιά, Αγκινάρα, Κρεμμυδάκι χλωρό, Φασόλι ξερό, Μπάμια, Μπρόκολο, Στέβια, Μύρτιλλο, Σμέουρο, Συκιά, Αβοκάντο, Κολοκύθι (αποκλειστικά για την ποικ. Melorepo), Σπανάκι (Υ&Θ), Αντίδι (Υ&Θ), Σταυναγκάθι (Υ&Θ), Ρόκα (Υ&Θ), Πράσο, ΟΣΠΡΙΑ (Υ&Θ): (Αρακάς, Φακή, Κουκιά, Ρεβίθι), Καπνός, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (Υ&Θ): (Ρίγανη, Σέλινο, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κοριάνδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι Βουνού, Τριανταφυλλιά (Για Αρωματοποιία)), Μαστίχα Χίου (Υ Μόνο): 4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(1) Συνολικά το μέγιστο των εφαρμογών δεν είναι παρατάνω από οκτώ.
(2) Συνολικά το μέγιστο των εφαρμογών δεν είναι παρατάνω από τέσσερις.
(3) Επειδή το σκεύασμα μπορεί να αφήσει ένα λευκό επίχρισμα πάνω στο φυτό συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το μέγιστο προτεινόμενο βλαστικό στάδιο.
(4) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις μικρής σημασίας χρήσεις από την εφαρμογή του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά, Φράουλα, Μαρούλι, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Νεκταρινιά, Ροδιά, Ακτινιδιά, Αγκινάρα, Κρεμμυδάκι χλωρό, Φασόλι ξερό, Μπάμια, Μπρόκολο, Στέβια, Μύρτιλλο, Σμέουρο, Συκιά, Αβοκάντο, Κολοκύθι (Ποικ. Melorepo), Σπανάκι (Υ&Θ), Αντίδι(Υ&Θ), Σταυναγκάθι (Υ&Θ), Πράσο, Ρόκα (Υ&Θ), Αρακάς, Φακή, Κουκιά, Ρεβίθι, Αρωματικά Και Φαρμακευτικά Φυτά (Υ&Θ) (Ρίγανη, Σέλινο, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κοριάνδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Μαστίχα Χίου (Υ Μόνο), Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι Βουνού, Τριανταφυλλιά (Για Αρωματοποιία): 3 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Αποφύγετε το συνδυασμό του με σκευάσματα που μπορεί να βλάψουν τους μικροοργανισμούς.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από ηλιακό φως.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία