



Αχλαδιά:
Φουζικλάδιο (*Venturia pyrina*), **Στεμφύλιο** (*Stemphylium vesicarium*), **Ωίδιο** (*Podosphaera leucotricha*), **Βακτηρι- ακό κάψιμο** (*Erwinia amylovora*), **Βακτηρίωση** (*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*). Εφαρμογές από το στάδιο του «ρουσκάματος» των οφθαλμών έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 51-81).

Δόση:
- 100 γρ./ στρ. για ύψος κόμης 100 εκ. (200 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 50 λίτρα/στρέμ- μα.
- 200 γρ./ στρ. για ύψος κόμης 200 εκ. (200 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμ- μα.
- 300 γρ./ στρ. για ύψος κόμης 300 εκ. (200 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 150 λίτρα/στρέμ- μα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 3/7-12

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Μηλιά, Αχλαδιά: 28 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Για να μην αναπτυχθεί ανεπιθύμητα, μην χρησιμοποιεί- τε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει fluopyram περισσότερο από 3 φορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμό στην ποικιλία Golden/ Golden Delicious και στις ποικιλίες που προέρχονται από αυτές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥ- ΑΣΙΑΣ:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν χρησιμοποιώντας με σπάριο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναπαίθονται σε σημεία συλλογής για ανάκτη- ση ενόστευσης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟ- ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία μέχρι 40° C.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε συσκευασία.

15x90



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethylenglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια.

• **Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Πληροφορίες για το γιατρό:
Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα σκευάσματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γαστρική απόπλυση εντός των πρώτων 2 ωρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θεικού Νατρίου. Δεν υπάρχει ειδικό antidoto.

Αντενδείξεις: σπαστική

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερό **800 1135 353**
από κινητό **210 6166 332**



5 200309 811511 >

TOP CROSS SEAL AREA



Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
Υ.Α.Α.Τ.:60871/24.06.2019

Luna Care WG
Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστικές ουσίες: fluopyram 5% β/β, fosetyl-Al 66,6% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 25,41% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ



Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με προστατευτική και θεραπευτική δράση
για την καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

ΔΙΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΙΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικό γάντι/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε ολοσώμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολοσώμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Κάτοχος της άδειας: Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100



BONUS
STICKER



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

GR66788888A



ΛΟΥΝΑ ΚΕΑΡ WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς. Το Luna Care WG είναι μίγμα της νέας δραστικής ουσίας fluopyram και του fosetyl-Al. Το fluopyram δρα στην επιφάνεια των φυτικών ιστών και ταυτόχρονα παρουσιάζει διεσποτική δράση, διελασματο- κή κίνηση καθώς και ακροπέδαλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στο ενδύμακό σύμπλοκο της αναερόβιας του ηλεκτρικού αλυσίδας (Succinate Dehydrogenase, SDH, σύμπλοκο II) και έτσι διακόπτει την αναπνοή στα μιτοχόνδρια. Το fluopyram δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων κατά τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη αποριγένεση. Το fosetyl-Al είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, παρουσιάζει αποπλαστική και συμπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη αποριγένεση του μύκητα. Ελέγχει αποτελεσματικά διάφορες ασθένειες που οφείλονται σε Φυκομύκητες, ενώ επιπλέον παρουσιάζει δράση εναντίον αρκετών φυτοπαθογόνων βακτηρίων. Ο συγκεκριμένος τρόπος δράσης του fosetyl-Al επάγει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών, αποτρέποντας κατ'αυτών τον τρόπο την εμφάνιση ανεπιθύμητων στελεχών των μυκήτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκάσμος φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ/ΔΙΑ- ΛΥΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:
Αμέσως μετά τον ψεκάσμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασιού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασιού, την αντλία και τα ακροφύσια 3 φορές, με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν οι ατμός και τα ίχνη του προϊόντος.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:-
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑ- ΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡ- ΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:
Μηλιά (εκτός των ποικιλιών Golden, Golden Delicious και των ποικιλιών που προέρχονται από αυτές):
Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*), **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*), **Βακτηρίωση** (*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*). Εφαρμογές από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10 mm (στάδιο καρπιδίου) έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 71-81).

LONG SEAL AREA

15x90

BOTTOM CROSS SEAL AREA

15x90

BOTTOM PART HIDDEN WHEN BAG IS STANDING