

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτικοφέρες • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρονιμοποιείτε • Μην αναπνέετε τους απούς • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Να φοράτε κατάληπτη προστατευτική ενδυμασία, κατάληπτη γάντια και ασυκεύη προστασίας ματών / προσώπου • Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση απυγήματος ή αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Απομακρύνετε τον παθόντα από τη μοιλσυμένη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μοιλσυνθεί. Να μη χρηγόρηστε τίποτε από το στόμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πληθύστε μαύρα με άφθονο νερό και ασπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 77 93 777

60/0



KABUKI
pyrafylifen-ethyl (μηρανούρωμέν εθυλ) (ομάδα φανούρωμαριδανού)
Εγγυημένη σύνθεση: pyrafylifen-ethyl 2,65% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 37,32% β/β

Γαλακτωματοποιίσμα Υγρό (EC)

Φυτορυθμιστικό σκεύασμα που προορίζεται για την αποφύλλωση του βάμβακος με στόχο τη διευκόλυνση της συγκομιδής

Xn

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται
- Ερεβλεῖ το δέρμα
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
- Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ήνεμούς, σε περίπτωση κατάποσης

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 8197/ 24-6-2009

ΦΥΛΑΚΙΣΜΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΟΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 100 Κ.Ε.Κ.



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
Το υπικό και ο περιέκτης του να θεωρούνται κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλατα.
Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δεντρικό δεδομένον ασφαλείας.

Πα να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης

Παρασκευαστής σκεύασμάτων: Nichino Nohyaku Co. Ltd, Iανονία Κάτοχος της έγκρισης: Nichino Europe Co. Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο Εργοστάσιο παρασκευής: Nichino Service Co. Ltd, Iανονία/AGROCROS, S.A. AVDA, Iανονία Υπεύθυνος επικοινωνίας: Υπεύθυνος για τη τελική συσκευασία και σημαντικός Εργοστάσιος συσκευασιών: ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@euthymiadis.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Διαβάστε τις συμμμενές οδηγίες πριν από τη χρήση



190X43

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Φυτορυθμιστικό σκεύασμα που προορίζεται για την αποφύλλωση του βάμβακος με στόχο τη διευκόλυνση της συγκομιδής. Το ώρα συστατικό του σκεύασμάτος (pyrafylifen-ethyl) έχει διανικοτόνο δράση που οφείλεται στην παρεμπόδιση του ενζύμου οξειδάσης του πρωτοπρηφυρογόνου (Pratoporphyrinogen-Oxidase, PPG-O ή PP-O) ενός βασικού ενζύμου για τη βιοσύνθεση της πρωτοπρηφυρίνης (protoporphyrin).

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Βαμβάκι. Αποφυλλωτικό. Δόση: 10 κ.ε.κ./στρ. + 100 κ.ε.κ./στρ. φυτικό πλάι Codacide, 50-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με φεκασμό φυτλώματος όταν το 30%-50% των καρυδών είναι ανοικτά (περίπου 90% ώριμα). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλημετρική περίοδο: 1

Τρόπος εφαρμογής: Φεκασμός φυτλώματος. Ομοιόμορφος φεκασμός με 50-60 λίτρα νερό/στρέμμα (εξαρτάται από το μένεθος των φυτών, την ποικιλία, το φεκαστικό μηχάναμα). Δράση από επαφή γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται πολύ καθό λούσιμο των φυτών. Αν ο φεκασμός γίνεται σε εύρωστα φυτά να φεκάζεται με μεγαλύτερο σύγκ φεκαστικού διαλύματος. Να εφαρμόζεται με χρήση ελικυστήρα.

Τρόπος παρασκευής φεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Τα προϊόντα πρέπει να αναμιγνύεται στην προτέρων με το πλάι για να γίνει ένα ομογενοποιημένο γαλάκτωμα. Αραιώστε το μήγα με το πλάι σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο φεκαστικό και συμπληρώστε με το υπόδιπτο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Ξεπινύνετε το δοχείο με νερό τουλήσιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα απορρίμματα στο φεκαστικό.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με το φυτικό πλάι Codacide.

Καθαρισμός φεκαστήρα: ξέπλυμα με άφθονο νερό.

Στοιχεία φωτοτοξικότητας: Το προϊόν σαν αποφυλλωτικό βάμβακος, προκαλεί νέκρωση ή αποξήρωση στα φύλλα και στα πράσινα μέρη του φυτού με τα οποία έρχεται σε επαφή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 14 πημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόδοση του φυτορυθμιστικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φίλαθλες /δόκεια ζεπτίνονται υπό πίεση με ειδικό μηχανήματος ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του επιζύματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπογυμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περιστέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ομπείο συλληπτής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκεύασμάτων: Φυλάξτε το στην αρχική του κουτιού συσκευασία, σε μέρος δροσερό (σε θερμοκρασίες <40°C) και ξηρό μακρά από το πηγές θερμότητας και το αμέσως πλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

• Μη μοιλύνετε τα νερά με τη συσκευασία ή τη συσκευασία

Na μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά / Na αποφευχθεί π η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποκευτώσης από τις πιθωτήρες επιφάνειες και τους δρόμους.

• Η παραστατική προστασία στην αποθήκευση της σκεύασμάτων πρέπει να αφένεται μία αφένεται ζώνη προστασίας 3m από τις επιφανειακά νερά.

Η εφαρμογή θέτει σε κίνδυνο τα ωρέματα αρθρόποδα, πρέπει να διευκολύνεται η αποκατάσταση των πληθυσμών και να αποφεύγεται η διαφυγή σε γειτονικά όρια και αγροτεμάχια.

Na μην εφαρμόζεται διανοτή.

190X43