GR06128794A

Sekator® OD

250ml e

ΑΑΔΑ Υ.Α.Α.Τ.: 70021 / 28-01-2013

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Εγγ. σύνθεση: amidosulfuron 10,6 % β/ο & iodosulfuron-methyl-sodium 2,5 % β/ο
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 25 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 64,36 % β/β

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

της οικογένειας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση πλατυφύλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της οικογένειας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση πλατυφύλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μετατοπίζεται προς τα ανώτερα μέρη του φυτού. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά αμέσως μετά τον ψεκασμό και τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται. Η πλήρης νέκρωσή τους επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το χύνετε στο ψεκαστικό δοχείο ανάδευσης, κάλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό ανάδευσης πάντα καλά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: Λογάτε το καθάρισμα του μηχανήματος αμέσως στο γεμάτο. Ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα. Πολύ σημαντικό είναι να καθαριστεί το πρώτο φίλτρο μετά το δοχείο του ψεκαστικού, φίλτρο και το υπόλοιπο φίλτρο του μηχανήματος. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού στο 10% της χωρητικότητάς του με καθαρό νερό, και καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τους σωλήνες πολύ καλά. Ψεκάστε τα υπόλοιπα σε αμέκαστο σημείο του χωραφιού. Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα.

ΦΑΣΗΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Σιτάρι (μαλακό και σκληρό): Πλατυφύλλα ζιζάνια. Μεταφυτρωτικός ψεκασμός ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-6 φύλλων έως το τέλος του αδελφιάσματος. **Δόση:** 15 κ.εκ./στρέμμα (πακ.) **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-30 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Ευαίσθητα ζιζάνια: ανθεμίδα (*Anthemis* sp.), κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine*), κολλητσίδα μικρόκαρπη (*Galium spurium*), χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*), σινάπι άγριο (*Sinapis arvensis*), σινάπι ήμερο (*Sinapis alba*), μπιφόρο (*Bifora radicans*), βερόνικα (*Veronica hederaefolia*), ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), αγριαμάραντο (*Chrysanthemum segetum*), ανάγαλλιδα (*Anagalis arvensis*), καλενδούλα (νεκρολουλούδι) (*Calendula arvensis*), καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), σιούμπρο (*Sisibrium io*), στελλάρια (*Stellaria media*), δυδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)*, μυρώνι (*Scandix pecten-veneris*)*, πολυκάρπι (*Polygonum aviculare*)*.
*Τα ζιζάνια αυτά είναι ευαίσθητα στον ψεκασμόν ογι αργότερα από το στάδιο των 4 φύλλων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σιτάρι (Σκληρό και Μαλακό) : --

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΓΤΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες από χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 10° C), υπερβολική υγρασία ή ξηρασία, ή άλλους λόγους καθώς επίσης και όταν αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από 25-30° C, σε συνδυασμό με έντονη ηλιοφάνεια και ελάχιστη σπαρμός εδάφους υγρασία.
- Η δόση του Sekator OD δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχόπτωση ή πότισμα με καταιονισμό, μετά την παρόδο 2 ωρών μετά τον ψεκασμό.
- Μη χρησιμοποιείτε ψεκαστικές φυτών τα οποία είναι υπό λάνθ βλαβής ή απροσφορικής υγρασίας.
- Το Sekator OD εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό). Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γ' αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Για αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισπορής.

Χρόνος ύδατηια ασφάλειας μεταξύ εφαρμογής και σπαρής ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αφάβοτος (40 ημέρες μετά την εφαρμογή) ή σιτάρι (15 ημέρες μετά), αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

Χρόνος ύδατηια ασφάλειας μεταξύ εφαρμογής και σπαρής ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά την συγκομιδή του σιταριού μπορούν να σπαρούν γεωμερική ελιακοφαβή και γεωμερικά σιτάρια (τουλάχιστον 120 ημέρες μετά) ενώ ζαφαρόπετυλα, μπάκη και ηλιάνθοι την επόμενη άνοιξη, αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

Χρόνος ύδατηια ασφάλειας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Η εισόδος να μπαίνουν εργάτα στον αγρό όπου έχει εφαρμοστεί το Sekator OD συνιστάται να είναι 3 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΒΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό για τις ενκαρκιμένες καλλιέργειες στην εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΞΕΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η επιπόσμση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε αμπκαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την σωστή καταστροφή του.
Τα κενά υλικά συσκευασίας, εστιάνοντα υπό πίεση ή γίνεται τρπλό ξέπλυμα (τα νερό του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπομένως με σχίσιμο, για τη διάφαλιση της μη πεζοπόζου χρήσης, ενσταστέβεται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες δωματίου (0°C έως 35°C) το σκεύασμα παραμένει σταθερό τουλάχιστο για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με το μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Χρησιμοποιείτα συσκευή προστασίας μαπκών/προσώπου. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Ανατρέξτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πρώτες Βοήθειες: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε κάθε περίπτωση:** Δείξτε αυτή την ετικέτα στον ιατρό και σε περίπτωση ανάγκης δείξτε τις οδηγίες χρήσεις ή αυτή τη συσκευασία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μετρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μετρων από μη γεωργική γη.

Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σαρρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

5 200309 846834 >

200

100