


GR80202571B

**Άρτιστ 41,5 WG**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ζιζανιοκτόνο.

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για προσωρινή καταπολέμηση επιλογών ζιζανίων στην καλλιέργεια της πατάτας. Το μικροπαστικό παρεμποδίζει τη διάθεση και την αύξηση των μεριστικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ρίζικού συστήματος των ζιζανίων. Το μικροπαστικό παρεμποδίζει τη φωτοαύθετη στο φωτοαύθετη II.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το ARTIST εφαρμόζεται με ψεκασμούς εδάφους μέσω της επαρκούς και λόγω των ψεκασμών των πεπτατορύντων και όταν τα ζιζάνια είναι στο ευαίσθητο στάδιο της ανάπτυξής τους. Συνιστάται με ψεκασμούς κάθε καλλιέργειας περίοδο. Προκειμένου το πρώτο να δέλξει την άρση τρόπου του, είναι απαραίτητη η υπαρξη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Εάν δεν υπάρχει, συστηγίστε ελαφρύ πόπος εντός 5-6 ημερών μετά την εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συντασμένη δόση των σκευάσματος. Συμπήρωνομε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Χρησιμοποιήμετε τύπου «οκούπας» και πίεσε μικράτερα 3 λάτη.

ΦΑΣΗ ΜΑΔΡΑΣΣΕΣ
ΠΕΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Πατάτα
Προσωρινή εφαρμογή μετά τη σπόρι μέχρι και λόγω των ψεκασμών των πατατοφύλλων μόνο όταν τα ζιζάνια είναι στο ευαίσθητο στάδιο της ανάπτυξής τους. **Στόχος:** Τραχύ βίτρο (Amaranthus retroflexus). Πλανοτό βίτρο (Amaranthus blitoides). Κόλπητρα (Chenopodium album).

Αγριοκάπιτο (Spiraea arvensis), Λουβούνιδα (Polygonum aviculare), Αγριοκαπιτά (Spiraea canescens), Τραχύ βίτρο (Amaranthus retroflexus spp.), Μέτρια ευιδιότητα εντός τα ζιζάνια: Αγριοντόμητα (Solanum nigrum) και Μουχάσια (Echinocystis crus-galli).

Δόση: α) 200 γρ. σκευάσματος/τρέμα σε δόσητ αριθμό, πηγαδιμάση/ελαφρά, β) 250 γρ. σκευάσματος/τρέμα σε εδάφη

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΦΗΓΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Στην οργική του κλεψτή αυσκευασία, με μέρος δροσερό και καλά αερίζεται ο συστιτύνεται μέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι τουλάχιστον 2 χρόνια.

Ημερ. Παρασευτής - Ημερ. Ημίτης Βλέπε στο καπάκι του κιτσού Αρ. Παρτίδας Βλέπε εσωτερική συσκευασία.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Πρώτης βοήθειας:

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή οδικής επιδρούσης: Καλέστε το KΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα στη περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από στόχυμα:

Μετακινήστε τον ασθενή μακριά από την περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε το ακεύασμα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αιφνιδέρετε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προβεβημένα μέρη του ασθενούς με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με νερό και για την πατάτα απέγουν λιγότερο από:

- 10 μέτρα από γετονικές καλλιέργειες ή χωρά και για την πατάτα

- 5 μέτρα για την πατάτα από τα επωφελικά υδάτα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως καλά τα προσβεβημένα μέρη του ασθενούς με άμβραν νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με νερό και για αρκετά λεπτά. Αν ο ρευματός επιμένει, συμβουλεύτετε αρρενολιμάτρα.

Σε περίπτωση κατάστασης καλέστε αριθμός γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείται συμπληρωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



1 κιλό ε

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.: 7691/7-2-2007

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεση:
• Iflufenacet 24% β/β
metribuzin 17,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 55,5% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

**Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάποιος της ένκρισης,
Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και ομήλων:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προσορίζεται μόνο για επαγγελματικές χρήστες.



BONUS STICKER

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερά: 800 1135 353
από κινητό: 210 6166 332



Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr