



1Le

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 70164/27-06-2016

Laudis OD
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Εγγ. Σύνθεση: tembotrione 4,4% β/ο
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: isoxadifen-ethyl 2,2% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 93,21% β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της άδειας,
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Πρόγραμμα Επιβράβευσης



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΛΑΟΥΝΤΕ OD
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των τριετώνων για την μεταφυτευτική καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόαπο και στον νηικό αραβόαπο.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθαρός ψεκασμός.

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:
ΑΡΑΒΟΣΙΣ, ΓΛΥΚΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΣ: Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Μεταφυτευτική εφαρμογή όταν α) ο αραβόαπος είναι στο στάδιο των 2-8 πραγματικών φύλλων και β) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2 φύλλων έως την έναρξη του αδελφώματος και η πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 φύλλων έως την πλήρη έκπτυξη 3 πλάγιων βλαστών.
Όχιες ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα.

1. Δόση: 170-225 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 1/-
2. Δόση: 115 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/7-14.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 170-225 κ.εκ/στρ. ή 2 x 115 κ.εκ./στρ.: Αγρωσθώδη (Abutilon theophrasti), Ακακία (Acacia saligna), Βλήτη τραύη (Amaranthus retroflexus), Πλαγιάτο βλήτο (Amaranthus bioides), Βλήτο (Amaranthus sp.), Αμβροσία (Ambrosia artemisiifolia), Βιάνος λιπατός (Chenopodium album), Αραβόαπος (Cynodon dactylon), Τάραλος (Cytaria staminatum), Αμπάχορο (Digitaria sanguinalis), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Πολυκόμμο (Polygonum aviculare), Λάπατσα (Polygonum lapathifolium), Αγριοπερίδα (Polygonum persicaria), Αγριο σανάρι (Sinapis arvensis), Αγριοτσικιά ή σπύριος (Solanum nigrum), Βέλοςπος από σπόρο (Sorghum halepense), Αγριοελάνθη (Xanthium strumarium)
2. Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ./στρ. ή 2 x 115 κ.εκ./στρ.: Καπνόχορο (Fumaria officinalis), Πάνικο (Panicum capillare, P. dichotomiflorum)
3. Μερτίριες ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ./στρ. ή 2 x 115 κ.εκ./στρ.: Αναρχωμένο πολύκωμο (Bidens pilosa cononuloides), Σποδόλυπη σαρύρα (Sida verticillata)
4. Η δόση του Laudis OD εξαρτάται από την πυκνότητα καδών και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει tembotrione και isoxadifen-ethyl.
• Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Μακριά από παιδιά.
• Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
• Αποφεύγετε να αναπνεύσετε εκκενώματα.
• Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.
• Μαζέψτε τη χυμμένη ποσότητα.
• Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
• Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αμείκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 1 μέτρο με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων 50% μειωμένης διασποράς.
• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς από τη διασπορά και την απορρόφηση του ψεκαστικού υγρού, αφήστε διατηρητή μέχρι τα σάματα εμφανιστούν ύδατων μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων στη μονή εφαρμογή ή 10 μέτρων στη διπλή εφαρμογή.
• Φοράτε ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά:
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση.

Επώση με το δέρμα:
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

Επώση με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.

Κατάποση: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Υπάρχει ο κίνδυνος εσόδου του σκευάσματος στους πνεύμονες εάν προκληθεί εμετός μετά από κατάποση. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Θεραπεία: Συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται ιατρική αγωγή. Παρόλα αυτά, εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα σκευάσματος (μεγαλύτερη από 100g), χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θετικό Νάτριο. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αραβόαπος, Γλυκός Αραβόαπος, Μη εραρωσάσιμο.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΧΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΝΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΨΩ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Να μην εφαρμόζεται σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.
Το Laudis OD μπορεί να εφαρμόζεται σε ποικιλίες παπικου

- Συστήνεται η εφαρμογή να πραγματοποιείται με τρυκότερ με κλειστή καμπίνα.

- Να εφαρμόζονται αναλογικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή αναπτύξης ανθεκτικότητας.

• Προφύλαξης για τις παρακείμενες καλλιέργειες.

- Φυλάξτε σε ήπιες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο. Αποφύγετε την εφαρμογή με υψηλή πίεση του ψεκαστικού μηχανήματος.

- Κατά τον ψεκασμό, πρέπει να αποφευχθεί σπασίωση της διασπορά του προϊόντος σε απίθανες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε καλλιέργειες ζωοτροφών, μπιζελού, σόγιας, πατάτας, ηλιάνθου και ελαιακράμβης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις ομοισώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψομάρτυρες που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόνη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθετώνται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ:
• ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβόαπου, στην ίδια περίοδο μπορούν να σπαρθούν οι κάτωθι καλλιέργειες:

- Βαμβάκι και σόγια χωρίς όγκωμα ή φασόλια, ταμάκια και λάχανο μετά από όργωμα και αφήνοντας χρονικό διάστημα 14 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Laudis OD και της νέας σποράς.

- Αραβόαπος χωρίς όργωμα και αφήνοντας χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Laudis OD και της νέας σποράς.

Δεν προτείνεται η σπορά ηλιάνθου.

• ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
Μετά την εφαρμογή του Laudis OD, στο πλαίσιο της αμεικτοσποράς, μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες:

- Καρότα, μαρούλι, κρόφιρα και ελαιακράμβη: 4 μήνες μετά την εφαρμογή.

- Μηλίτη, κρεμμύδι, ροπανίκι και σπάρτα: 5 μήνες μετά την εφαρμογή.

- Τομάτα και ηλιάνθος: 6 μήνες μετά την εφαρμογή.

- Μπιζέλια και ζωοτροφές: 9 μήνες μετά την εφαρμογή.

• ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Να μην εισέρχεται στην ψεκασμένη περιοχή προτού στεγνώσουν εντελώς τα φύλλα. Στην περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακριά ποσάκια και μακρομάνικο ποικιόμο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

ΣΥΝΗΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Στην αρχική εφαρμοσμένη συσκευασία του, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια. Μην αποθηκεύετε το σκεύασμα σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 40° C. Προστατέψτε από τον παγετό.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ - ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερό: 800 1135 353
από κινητό: 210 6166 332



GR80255977D



5 200309 856406 >

Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr



900
800
700
600
500
400
300
200