

ΜΠΑΪΟΠΑΟΥΕΡ SL

Επιφανειοδραστικό. Σε συνδυασμό (μίγμα βυτίου) με Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ

Το Biopower SL χρησιμοποιείται ως συνεργό ζιζανιοκτόνων σε στενόφυλλες καλλιέργειες με τη γενική δοσολογία των 60-100 ml/στρέμμα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως. Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Σταθερότητα αποθήκευσης: 24 μήνες

Η θερμοκρασία αποθήκευσής του δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 0° C. Θερμοκρασία αποθήκευσης <30° C.

Ημερ. Παρασκευής - Αρ. Παρτίδας:

Βλέπε άνω μέρος της φιάλης.



Bayer

Διανομέας
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr



Biopower[®] SL

1 Λίτρο e

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγ. σύνθεση: alkylethersulfate sodium salt (αλκυλεθερσουλφείτ σόντιουμ σάλτ): 38,35% β/β

Συnergό Ζιζανιοκτόνων σε στενόφυλλες καλλιέργειες

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικές υποδείξεις: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον ασθενή σε σταθερή θέση (ξαπλωμένο στο πλάι). Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα ασφαλώς.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό 900 και σε ηρεμία. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό 800

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Συμπτώματα: Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης, η πλύση στομάχου θα πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις κατάποσης μεγάλης ποσότητας, μόνο εντός των δύο πρώτων ωρών. Παρόλα αυτά, εφαρμογή ενεργού άνθρακα και θεικού νατρίου συστήνεται 700 πάντα.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει αντιδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210-7793777

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. • Πλένετε τα χέρια αμέσως μετά την εργασία και εάν χρειάζεται κάνετε μπάνιο. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και καθαρίστε τα επιμελώς πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερό: 800 1135 353
από κινητό: 210 6166 332



GR80260024B



5 200309 842706