



PACIFICA PLUS

500 gr e

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας  
Υ.Α.Α.Τ.: 70137 / 27.10.2015

Εναιωρηματοποίηση κόνκι (WG)  
Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστικές ουσίες: amidosulfuron 5% β/β, idosulfuron-methyl-sodium 1% β/β, mesosulfuron-methyl 3% β/β  
Αντιψυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 9% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 90,07% β/β

## Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για  
επαγγελματίες χρήστες.



Κάτοχος της άδειας,  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση  
στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,  
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6166000  
Fax: 210 6109100

### ΠΑΣΦΙΚΑ ΠΛΑΣ

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινό σπάρει (σκληρό και μαλακό), σίκαλη και τριπλόκλη. Το Pacifica Plus είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθέτωση του δευτερογενούς, όπως σταματά στα ζιζάνια η βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξη τους (λευκίνης, ισολευκίνης, βαλίνης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανόνη όσο και με τον κοπόνια χυμό. Κύριο σημείο δράσης είναι οι μεριστωματικοί ιστοί των ζιζανίων. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμωμένων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μικρό τύπου σκούπας και πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI).

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψομεινούς που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχοιμίο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Pacifica Plus σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μετάξι της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Pacifica Plus συνιστάται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φυλάσσετε κλειδωμένο. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα στομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. • Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη που αποστραγγίζονται τεχνητά, για τις χρήσεις σε χειμερινά σπάρει. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη ως ακολούθως: Σπάρει Χειμερινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη και Τριπλόκλη: 10 μ. + ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς ή 5 μ. + ακροφύσια 90% μειωμένης διασποράς. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τις διάφορες φάσεις χειρισμού του σκευάσματος. • Να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΩΤΟ

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:  
Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε προεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. • Σε περίπτωση ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό (εάν υπάρχει, με polyethylene glycol 400). • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Σε περίπτωση ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν το ξαναχρησιμοποίησετε. • Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.  
Πληροφορίες για το γιατρό:  
Θεραπεία: Συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρ'όλα αυτά, εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (περισσότερη από μια γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θεϊκό Νάτριο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ  
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7  
από σταθερό: 800 1135 353  
από κινητό: 210 6166 332

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΔΡΩΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:**

**Σπάρει Χειμερινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριπλόκλη:** Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια. Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου και β) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 έως 6 φύλλων. Δόση: max. 50 γρ./στρέμμα + προσθήκη 100 ml/στρ. Βiorower. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• **Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 30 γρ./στρ.):** Ανεμόχορτο (*Apera spica-venti*), Κοπή πίδα (*Poa annua*), Τραχεία λιβαδιότα (*Poa trivialis*)  
• **Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 50 γρ./στρ.):** Ήρα πολυάνθη (*Lolium multiflorum*), *Ambrosium elatum* (ευαίσθητο μέρος), Βρόμος (*Bromus sp., Bromus hordeaceus*), Αγριοβρώμη (*Avena sp., Avena fatua*), Φάληρα (*Phalaris sp.*), Στελλάρα (*Stellaria media*, *Stellaria sp.*), Κεράσι (*Cerastium arvense*), Μεγάλη κολλιτσιότα (*Gallium aparine*), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*), Αγριοσαντι (*Stachys arvensis*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), *Arenaria serpyllifolia*  
• **Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 30-50 γρ./στρ.):** Αλεπουρά (*Alopecurus myosuroides*)  
• **Μερίκι ευαίσθητα ζιζάνια:** Μυσοσίπ (*Myosotis arvensis*), Κοινός αγριοπανός (*Viola sp.*), Βερονίκη (*Veronica arvensis*)  
**ΔΕΥΤΕΡΙΑ ΕΠΙΒΛΗΠΗ ΠΙΝΗ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Σπάρει Χειμερινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριπλόκλη - **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡ ΤΙΣ ΟΠΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

• Κατά την εφαρμογή αποφεύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε τεύλα ελακορμής και μηλιέλα. • Παρόμοια συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως γήωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή, μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ή παγετός πριν ή μετά την εφαρμογή.  
**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το Pacifica Plus, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες.

- Με ή χωρίς όργωμα: Ανοϊξάντικο σπάρει.  
- Εφόσον εφαρμόστηκαν 30 γρ. σκευάσματος/στρέμμα και μετά από όργωμα: Ανοϊξάντικο κρήβρι ή αραβόσπορος.  
**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Μετά την εφαρμογή του Pacifica Plus, στο πλαίσιο της αμειωτοσύνης μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άρση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: βρώμη, ζαχαρότευτλα, μαλακό και σκληρό σπάρει, κοκιά, λινάρι, αραβόσπορος, κρήβρι, μηλιέλα, πατάτα, σίκαλη, σόγια, σόργο, ηλιάνθος και τριπλόκλη. Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελακορμής (σπάρει κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί άρση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών. Σε περίπτωση ξηρού έτους συνιστάται να προηγηθεί βαθύ όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστών.  
**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.  
**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  
**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΜΕΡ. ΑΔΗΣΗΣ:** Βλέπε συσκευασία



GR84102962A



5 200309 854914 >

Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6166000  
Fax: 210 6109100  
www.bayercropscience.gr