

GR84971715A



# Fosburi®

600 SC

2L e

**Προσκωνμένο αιώρημα (SC)**

**Σύνθεση:** Δραστικές ουσίες: diflufenican 20% β/ο, flufenacet 40% β/ο  
Γαλακτικές ουσίες: 49,41% β/β

## Σταφυλουργικό Ζιζανιοκτόνο

ν καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων  
λακό σιτάρι και κριθάρι.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**  
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.:  
70368 / 14-01-2020

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



## **Φόσμπουρι 600 SC**

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:**

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε μαλακό σπάρει και κριθάρι.

Το diflufenican είναι ζιζανιοκτόνο επαφής που χαρακτηρίζεται από περιορισμένη μετακίνηση καθώς και από μεγάλη υπολειμματική διάρκεια. Δρα αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καρτενοειδών προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό ή λεύκανση των νεαρών ζιζανίων. Το κόκκινο-πορφυρό χρώμα του φυλλώματος το οποίο συχνά παρατηρείται μετά την εφαρμογή είναι αποτέλεσμα του στρες που προκαλείται από την έλλειψη των καρτενοειδών. Στη συνέχεια, τα νεαρά ζιζάνια νεκρώνονται.

Το flufenacet είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που μετακινείται κυρίως αποπλαστικά και εφαρμόζεται για την καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας τη διαίρεση και την αύξηση των μεριστωματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ριζικού συστήματος και να διακόπτεται η ανάπτυξη των ζιζανίων, τα οποία τελικά νεκρώνονται.

Το diflufenican και το flufenacet απορροφούνται κυρίως από τη ρίζα αλλά και από το φύλλωμα των νεαρών ζιζανίων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης και ακροφύσια τύπου σκούπας.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα

ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του προϊόντος.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Καμία.

### **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:**

**Χειμερινό Σπάρει (Μαλακό), Χειμερινό Κριθάρι:** Εφαρμογή το φθινόπωρο όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-3 πραγματικών φύλλων (BBCH 11-13) και:

- τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο πριν το φύτρωμα και μέχρι το στάδιο των 3 φύλλων,
- ενώ τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο πριν το φύτρωμα και μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων.

**Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια.**

**Δόση:** 60<sup>l</sup> κ.εκ./στρέμμα (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-30 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος:** 1.

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

#### **Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**

#### **Ευαίσθητα ζιζάνια**

Κοινή Πόα (*Poa annua*)

Ανεμόχορτο (*Apera spica-venti*)

Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*)

Ήρα (*Lolium* sp.)

Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)

Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*)

Μεγαλόκαρπη Κολητσιδα (*Galium aparine*)

Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*)

Άγριο Σινάπι (*Sinapis arvensis*)

Στελλάρια (*Stellaria media*)  
Αγριοπανοσές (*Viola tricolor*)  
Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*)  
Ρανούνκουλος (*Ranunculus arvensis*)  
Βερονίκη (*Veronica arvensis*, *V. persica*, *V. hederifolia*)  
Γεράνιο (*Geranium dissectum*)  
Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*).

#### **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

**Σπάρι (Μαλακό), Κριθάρι:** Μη εφαρμοσίμο.

#### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

Το σκεύασμα περιέχει τα **diflufenican** και **flufenacet**, ζιζανιοκτόνα που ανήκουν στις ομάδες **F1** και **K3** αντίστοιχα, κατά HRAC.

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν έχει άνεμο.
- Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και του Fosbui 600 SC συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών.
- Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γεπτονικές καλλιέργειες και κυρίως σε βρώμη και ελαιοκράμβη. Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε ακροφύσια χαμηλής διασποράς.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η σπορά είναι επιφανειακή ή ακανόνιστη καθώς και σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες λόγω κακού φυτρώματος, υπερβολικής εδαφικής ξηρασίας ή υγρασίας ή παρουσιάζουν μυκητολογικές προσβολές.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε αμμόδη, χαλικώδη ή διηθητικά εδάφη.
- Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή μεγαλύτερη ή ίση με 15 χιλιοστά στις επόμενες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή.
- Σε περίπτωση βροχόπτωσης μεγαλύτερης ή ίσης με 50 χιλιοστά στις

επόμενες 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας.

- Μην κάνετε σβάρνισμα ή κλίνδρισμα του εδάφους τουλάχιστον 1 μήνα πριν την εφαρμογή.

#### **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:**

##### **- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:**

Σε περίπτωση **αποτυχίας** της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα, στο ίδιο χωράφι και εφόσον ακολουθήσει όργωμα του εδάφους μπορεί να ξανασπαρθούν οι παρακάτω καλλιέργειες:

- Μετά από τουλάχιστον 3 μήνες: σκληρό ανοιξιάτικο σπάρι

- Μετά από τουλάχιστον 4 μήνες: ανοιξιάτικο μπιζέλι

- Μετά από τουλάχιστον 4,5 μήνες: πατάτα

Επιπλέον, με ή χωρίς όργωμα μπορούν να σπαρθούν οι παρακάτω καλλιέργειες:

- Μετά από τουλάχιστον 3 μήνες: ανοιξιάτικο μαλακό σπάρι και ανοιξιάτικο κριθάρι

- Μετά από τουλάχιστον 4 μήνες: λινάρι

- Μετά από τουλάχιστον 4,5 μήνες: ηλιάνθος

- Μετά από τουλάχιστον 5 μήνες: αραβόσπτος και σόργο

Να μη σπαρθούν οι παρακάτω καλλιέργειες: ανοιξιάτικη βρώμη, σόγια, ανοιξιάτικη ελαιοκράμβη, τεύτλα και μηδική.

##### **- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:**

Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες:

- Με ή χωρίς όργωμα: μαλακό και σκληρό χειμερινό σπάρι, χειμερινό και ανοιξιάτικο κριθάρι, ανοιξιάτικη βρώμη, χειμερινή ελαιοκράμβη, χειμερινό και ανοιξιάτικο μπιζέλι, αραβόσπτος, ηλιάνθος, ζαχαρότευτλα, πατάτα, λινάρι, χειμερινή σίκαλη, σόργο, μηδική (φθινοπωρινή ή ανοιξιάτικη σπορά).
- Με όργωμα: σόγια.

**Ενδιάμεσες καλλιέργειες για προστασία των εδαφών (π.χ. νιτρορύπανση):**

Σε ένα διάστημα 8 μηνών μετά την εφαρμογή του Fosburi 600 SC και μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, είναι δυνατόν να σπαρθούν χωρίς όργανο να ειδή ενδιάμεσες καλλιέργειες: σινάπι, ραπανάκι, κράμβη, ήρα ιταλική, χειμωνιάτικη σίκαλη, φακελωτή (μελισσόχορτο) και φαγόπυρο.

**- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συστάσιμες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:** Βλέπε συσκευασία.

## ΠΡΟΣΟΧΗ



### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα), ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Περιέχει preventol και flufenacet. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
- Μην αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα.
- Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμειξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

### **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

**Γενικά:** Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση.

- Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.**

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

- **Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν φοράτε, μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Προκαλέστε εμετό μόνο εάν:

1. Ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του,
2. Δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια άμεσα διαθέσιμη,
3. Σημαντική ποσότητα έχει καταποθεί, περισσότερο από μια γουλιά,
4. Δεν έχει περάσει περισσότερο από 1 ώρα από τη στιγμή της κατάποσης (σε περίπτωση εμετού αποφύγετε την εισρόφηση του υγρού στην αναπνευστική οδό). Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

**Συμβουλές για το γιατρό:** Υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού μεθεμογλοβίνης.

**Θεραπεία:** Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης η πλύση στομάχου πρέπει να ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θεικού νατρίου συνιστάται πάντα. Σε περίπτωση μεθεμογλοβινεμίας, πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και ειδικά antidotes (methylene blue/ toluidine blue).

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

**24/7**



**Bayer**

Bayer Ελλάς ABEE  
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι  
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100  
[www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)



GR84971715A



5 200309 850787 >

GR84971715A



# Fosburi®

600 SC

2L e

**Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)**

**Εγγραμμένη σύνθεση:** Δραστικές ουσίες: diflufenican 20% β/ο, flufenacet 40% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 49,41% β/β

## Μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο

για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων  
σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**  
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.:  
70368 / 14-01-2020

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

