



**ATLANTIS<sup>®</sup>**  
FLEX

**330 gr e**

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ:  
70244 / 15-09-2017

**Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι (WG)**

Εγγ. Σύνθεση: Δραστική ουσία: mesosulfuron-methyl 4,5 % β/β, propoxycarbazone-sodium 6,75 % β/β  
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 9 % β/β.  
Βοηθητικές ουσίες: 87,97 % β/β

**Μεταφωτρωτικό εκλεκτικό  
Ζιζανιοκτόνο**

για την καταπολέμηση αγρωστωδών  
και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινό  
σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και τριτικάλε.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι. Τηλ. 210 6166000, Fax 210 6109100

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**BONUS  
STICKER**

**BayWin**  
Πρόγραμμα Επιβράβευσης

GRB4082066A



400

300

200

100

## Ατλαντίς Φλεξ

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Μεταφωτρωτικό εκλεκτικό ζζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζζανίων σε χειμερινό στάρι (σκληρό και μαλακό) και τρπκάλε.

Το mesosulfuron-methyl (χημική ομάδα σουλφουλοουρών) καθώς και το prochlorazobenzene-sodium (χημική ομάδα sulfonylamino-carbonyl-triazolinones) δρουν παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθέτουν το οξειγαλακτικό, οπότε σταματά στα ζζάνια η βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξη τους (λευκίνης, ισολευκίνης, βάλινης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται. Το mesosulfuron απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε ένα μικρότερο ποσοστό απορροφάται και από τις ρίζες του φυτού ενώ το prochlorazobenzene-sodium απορροφάται κυρίως από τις ρίζες του φυτού.

Η ανάπτυξη των ζζανίων σταματάει μία ημέρα μετά την εφαρμογή ενώ μετά από λίγες ημέρες εμφανίζεται χλωρίωση στο φύλλωμα. Η πλήρης νέκρωση των ζζανίων επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων. Στα λιγότερο ευαίσθητα ζζάνια παρατηρείται καθυστέρηση της ανάπτυξής τους, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ανταγωνιστικά ως προς την καλλιέργεια.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζζανίων με μικρο τύπου σκόπιας και πίεση μεγαλύτερη από 3 ατμ.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ** Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Atlantis Flex σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Atlantis Flex ουστώνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Χειμερινά σπάρη: Στάρι σκληρό, Στάρι μαλακό, Τρπκάλε

**ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Μεταφωτρωτική εφαρμογή όταν α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου (BBCH 13-32) και β) τα αγρωστώδη ζζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το αδέρφωμα (καλή γ) τα πλατύφυλλα ζζάνια είναι στο στάδιο των κοτυληδόνων έως τα 4-6 φύλλα.

**ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:** 1

ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ
<b>Αγρωστώδη ζζάνια</b> Αλεπουράκι ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ), Ανεμόχορτο ( <i>Apera spica-venti</i> ), Αγριοβρώμη ( <i>Avena fatua</i> , <i>Avena ludoviciana</i> , <i>Avena sterilis</i> ), Βρόμος ( <i>Bromus diandrus</i> , <i>Bromus sterilis</i> ), Ήρα πολιετής ( <i>Lolium perenne</i> ), Ήρα πολιάνη ( <i>Lolium multiflorum</i> ), Ήρα λεπτή ( <i>Lolium rigidum</i> ), Κοπή φάλαρη ( <i>Phalaris brachystachys</i> ), Μικρόκαρπη φάλαρη ( <i>Phalaris minor</i> ), Παράδοση φάλαρη ( <i>Phalaris paradoxa</i> ), Κοπή πόα ( <i>Poa annua</i> ), Τραχεία λειβαδοπία ( <i>Poa trivialis</i> ).	33 γρ / στρέμμα με την προσθήκη Biopower 100 ml/στρ.	10 - 40 λίτρα / στρέμμα
<b>Πλατύφυλλα ζζάνια</b> Ανεμίδα ( <i>Anthemis arvensis</i> ), Μπιφόρα ( <i>Bifora radians</i> ), Κεράστιο ( <i>Cerastium arvense</i> ), Χαμομήλι ( <i>Matricaria chamomilla</i> ), Ρανούικουλος ( <i>Ranunculus sardous</i> ), Ραπανίδα ( <i>Raphanus raphanistrum</i> ), Αγριο σινάπι ( <i>Sinapis arvensis</i> ), Στελλάριο ( <i>Stellaria media</i> )		

Όλα τα παραπάνω ζζάνια σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός τους, <b>ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ζζάνια:</b> Βρόμος ( <i>Bromus diandrus</i> , <i>Bromus sterilis</i> ), Ήρα πολιετής ( <i>Lolium perenne</i> ), Ήρα πολιάνη ( <i>Lolium multiflorum</i> ), Ήρα λεπτή ( <i>Lolium rigidum</i> ), Ανεμίδα ( <i>Anthemis arvensis</i> ), Μπιφόρα ( <i>Bifora radians</i> ), Χαμομήλι ( <i>Matricaria chamomilla</i> ), Ρανούικουλος ( <i>Ranunculus sardous</i> ).	20 γρ / στρέμμα με την προσθήκη Biopower 100 ml/στρ.	10 - 40 λίτρα / στρέμμα
--	--	-------------------------

● **Μετρίως ευαίσθητα ζζάνια στη δόση 33 γρ/στρέμμα:** Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*)

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ζζανίων:** Στάρι σκληρό, Στάρι μαλακό, Τρπκάλε: Δεν ορίζονται (τελευταία εφαρμογή στο στάδιο του σχηματισμού του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας BBCH 32)

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΝΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

- Ισχυρές συνθήκες εφαρμογής είναι θερμοκρασία 5°C και σχετική υγρασία πάνω από 60%.
- Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:
  - Ψεκάζετε σε ήμερες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο.
  - Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε ελαικοκράμβη και σε μπιζέλια. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ουσική μείωση της διασποράς (ακροφύση μειωμένης διασποράς). Τηρείστε τις ορθές πρακτικές εφαρμογής έτσι ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός λεπτών σταγονιδίων.
- Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλωρίωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή ή μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
- Εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες σε καλή βλαστική κατάσταση. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες λόγω υπερβολικής υγρασίας ή ξηρασίας, προσβολής από ασθένειες ή εχθρούς ή κακής εγκατάστασης της καλλιέργειας.
- Για αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας να χρησιμοποιούνται ζζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψοπορίας.

### ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

**- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:**

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, είναι δυνατή η επανασπορά του αγρού με τις κάτωθι καλλιέργειες και εφόσον προηγηθεί όργωμα του χωραφίου:

- Ανοιχτάκο σκληρό στάρι, αρακάς, ρεβίθι και πατάτα: 20 ημέρες μετά την εφαρμογή
- Αρακάς: 100 ημέρες μετά την εφαρμογή
- Πατάτα: 30 ημέρες μετά την εφαρμογή

Οστόσο, ενδέχεται να προκύψουν κάποια ελαφρά και παροδικά συμπτώματα.

**- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:**

Μετά την εφαρμογή του Atlantis Flex, στο πλαίσιο της αμειψοπορίας μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: χειμερινό κριθάρι, βρώμη, μπίζελι, λινάρι, ηλιάνθος, φασόλια, ζαχαρότευτλα, πατάτα, σόγια, σόργο, μηδική, αραβόσιτος, μάρθαρος, μαρούλι, ντομάτα. Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελαικοκράμβη (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών. Σε περίπτωση ξηραυ έτους, συνιστάται να προηγηθεί βαθύ όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστών.

Αμέσως μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας και αφού προηγηθεί κατεργασία του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10

εκατοστών ή όργωμα του χωραφίου μπορούν να σπαρούν οι κάτωθι ενδιάμεσες καλλιέργειες: τριφύλλι, ραπανάκι, σινάπι, ανοιξιάτικη βρώμη, χειμερινή σέκλη βίκος.

#### **- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** 24 ώρες

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:**

Να πραγματοποιείτε πολύ προσεκτικό καθαρισμό των ψεκαστικών μηχανημάτων αμέσως μετά την εφαρμογή του Atlantis Flex. Μη χρησιμοποιήσετε τα ψεκαστικά μηχανήματα για άλλο προϊόν αν δεν τα ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Αραιώστε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν (σε απέκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοστεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση).
2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού και αδειάστε τελείως.
3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 0,5 λίτρα από διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας έως 6% για κάθε 100 λίτρα νερού. Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αδειάστε το βυτίο και επαναλάβετε τη διαδικασία. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως.
4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπέκ και ξεπλύνετε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού που αναφέρεται στο σημείο 2 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

#### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:** Βλέπε συσκευασία.

### **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

**Γενικά:** Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

**Επαφή με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**Κατάποση:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

**Πληροφορίες για το γιατρό:**

**Θεραπεία:** Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης η πλύση στομάχου πρέπει να ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Παρόλα αυτά, η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συνιστάται πάντα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.**

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

**24/7**

## ΠΡΟΣΟΧΗ



### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα και γάντια κατά τη διάρκεια ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής.»
- Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια ασέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια 50% μειωμένης διασποράς. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.] • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

# Bayer

Bayer Ελλάς ABEE  
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι  
Τηλ: 210 6166000  
Fax: 210 6109100  
[www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

GR84082066A



5 200309 861363





**ATLANTIS<sup>®</sup>**  
FLEX

**330 gr e**

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ:  
70244 / 15-09-2017

**Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)**

Εγγ. Σύνθεση: Δραστική ουσία: mesosulfuron-methyl 4,5 % β/β, propoxycarbazone-sodium 6,75 % β/β  
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 9 % β/β.  
Βοηθητικές ουσίες: 87,97 % β/β

**Μεταφωτρωτικό εκλεκτικό  
Ζιζανιοκτόνο**

για την καταπολέμηση αγρωστωδών  
και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινό  
σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και τριτικάλε.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι. Τηλ. 210 6166000, Fax 210 6109100

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**BayWin**  
Πρόγραμμα Επιβράβευσης