



MESUROL[®]

500 SC

1L e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14166/13.12.2006

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Εγγ. σύνθεση: methiocarb 50%/β/ο
Βοηθ. ουσίες: 55,2%/β/β

Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

για την καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας σε καλλιέργειες αμπελιού, πιπεριάς, αγγουριού και τριανταφυλλιάς

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης: Bayer CropScience AG, Γερμανία
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΜΕΣΟΥΡΟΛ 500 SC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας σε καλλιέργειες αμπελιού, πιπεριάς, αγγουριού και τριανταφυλλιάς.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπο πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποθεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ψεκάσετε αντίθετα προς τον άνεμο.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αμπέλι: Θρίπας Καλιφόρνιας (*Frankliniella occidentalis*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 200κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην αναπνεύτε σταγονίδια/εκνεφώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φοράτε κατάλληλα γάντια από PVC και συσκευή προστασίας ματιών-πρόσωπου. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

Τριανταφυλλιά: Θρίπας Καλιφόρνιας (*Frankliniella occidentalis*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 200κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα /στρέμμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ: Αμπέλι, Πιπεριά (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Αγγούρι (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Τριανταφυλλιά: 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχετε στην περιοχή που ψεκάστηκε πριν περάσουν 48 ώρες. Για τις γεωργικές εργασίες και για διάστημα 96 ωρών από τον ψεκασμό, πριν εισέλθετε στην περιοχή να βάλετε προστατευτικά ρούχα και να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Σταφύλια (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 42 ημέρες,

Πιπεριά, Αγγούρι: Μη εφαρμοσμένο. Εφαρμογές πριν την άνθιση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Να αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απί ευθείας στο φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό μόνο εάν: 1. Ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. 2. Ιατρική βοήθεια δεν είναι άμεσα δυνατή. 3. Αν έχει καταποθεί μεγάλη ποσότητα. 4. Ο χρόνος που έχει περάσει από την κατάποση δεν υπερβαίνει την μία ώρα. **Καλέστε αμέσως γιατρό ή μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση εισπνοής,** ο ασθενής πρέπει να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΤΡΟ: Το προϊόν είναι παρεμποδιστής της χοληστεράσης. Παρακολούθηση του αναπνευστικού, καρδιακού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Συνεχής αιματολογικός έλεγχος (έλεγχος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της χοληστερόλης πλάσματος). Τακτικός Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος (ECG monitoring). Συνιστάται ενδοτραχειακή διασωλήνωση και πλύση στομάχου, ακολουθούμενη από χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα. **Σε περίπτωση εμφάνισης οπασμών:** Διαζεπάμ: για ενήλικες 5-10mg ενδοφλεβίως έως πλήρους καταστολής, για παιδιά 2,5mg ενδοφλεβίως. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Θεϊική στροπίνη (για ενήλικες δόση 2εώς 4 mg επαναλαμβανόμενη κάθε 10 με 15 λεπτά για όσο είναι απαραίτητο). **ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ:** oximes (pralidoxime, obidoxime), succinyl choline, aminophylline.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

GR80236611B



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr