



caLypso®
480 SC

100ml e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14004 / 4-2-2008

Πυκνό Εναιώρημα (SC)

Εγγ. Σύνθεση: thiacloprid 48% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 57,5% β/β

Διασυστηματικό Εντομοκτόνο

επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση
για την αντιμετώπιση κυρίως μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος
για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΚΑΛΥΨΩ 480 SC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εντομοκτόνο. Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση κυρίως μυζητικών καθώς και μασσητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Η δράση του εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της μεταφοράς των νευρικών ερεθισμάτων στα έντομα. Δρα ανταγωνιστικά ως προς την ακετυλοχολίνη που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των νευρικών σημάτων στα έντομα και δεσμεύεται αντί αυτής στους υποδοχείς της που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις. Το thiacloprid δεν αποδομείται όπως η ακετυλοχολίνη, αλλά παραμένει δεσμευμένο στη συγκεκριμένη θέση, με αποτέλεσμα να προκαλείται διατάραξη της ισορροπίας στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και τελικά θάνατος του εντόμου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να γίνει καλή διαβροχή του φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΧΘΡΟΣ- ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά:

Αφίδες (*Dysaphis plantaginea*, *Aphis pomi*). Προληπτικά (εκτός της

Aphis pomi), στο στάδιο της πράσινης κορυφής σε συνδυασμό με θερινό λάδι 2,5-3%. Κατασταλτικά, με την εμφάνιση της προσβολής, στο στάδιο των κλειστών μπουμπουκιών ή μετά την άνθηση-πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση. **Δόση:** 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.

Φυλλορυκτες (*Phyllonorycter blancardella*, *Phyllonorycter corylifoliella*, *Leucoptera malifoliella*). Εφαρμογή στο μέγιστο της εξόδου των ακμαίων από τα βομβύκια. Στην 1η γενεά συμπίπτει με το τέλος της άνθησης-πτώσης των πετάλων. **Δόση:** 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.

Καρπόκαφα μηλιάς (*Cydia pomonella*). Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων. **Δόση:** 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ: Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Νεκταρινιά:

Αφίδες (*Myzus persicae*, *Anuraphis persicae -niger*, *Hyalopterus spp.*, *Myzus cerasi*). Προληπτικά σε συνδυασμό με θερινό λάδι 2% μέχρι το στάδιο της ρόδινης κορυφής. Κατασταλτικά, με την εμφάνιση της προσβολής μετά την άνθηση και πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση.

Δόση: 15 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Πατάτα:

Αφίδες (*Macrosiphum euphorbiae*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 15-20 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-80 λίτρα / στρέμμα.

Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 15 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-80 λίτρα / στρέμμα.

Τομάτα (Θ+Υ), Μελιτζάνα (Θ+Υ), Πιπεριά (Θ+Υ):

Αφίδες (*Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aphis gossypii*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ):

Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 30 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Αγγούρι (Θ+Υ), Αγγουράκι για τουρσί (Θ+Υ), Κολοκυθάκι (Θ+Υ):

Αφίδες (*Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aphis gossypii*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι για τουρσί (Θ), Κολοκυθάκι (Θ):

Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 30 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα

/ στρέμμα.

Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ):

Αφίδες (*Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aphis gossypii*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 30 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

Βαμβάκι:

Αφίδες (*Aphis gossypii*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 10-15 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-70 λίτρα / στρέμμα.

Καπνός:

Αφίδες (*Myzus nicotianae*). Με την έναρξη της προσβολής. **Δόση:** 15 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Καλλωπιστικά (τριαντάφυλλο, γαρύφαλλο, χρυσάνθεμο, ζέρμπερα) (Θ+Υ):

Αφίδες (*Macrosiphum rosae*, *Aphis fabae*, *Aphis gossypii*, *Myzus persicae*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 25 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Καλλωπιστικά (τριαντάφυλλο, γαρύφαλλο, χρυσάνθεμο, ζέρμπερα) (Θ): Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 30

κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα / στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσμού.
- Λόγω του μεγάλου αριθμού ποικιλιών καλλωπιστικών να γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρό αριθμό φυτών πριν από την εκτεταμένη χρήση του σκευάσματος.
- Διάρκεια δράσης 14-21 ημέρες.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά):

Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 15 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (15-22,5 κ.εκ./ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα.

ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ, ΣΜΕΟΥΡΟ, ΜΥΡΤΙΛΛΑ:

Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*), Αφίδες (*Aphis* sp.), Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*, *Ceratitis* spp). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 15 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (15-22,5 κ.εκ./ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα.

ΣΥΚΙΑ:

Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*), Αφίδες (*Aphis* sp.), Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*, *Ceratitis* spp), Λογχαία ή μαύρη μύγα των σύκων (*Carpolonchoea aristella*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 15 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (15-22,5 κ.εκ./ στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/ στρέμμα.

ΦΡΑΟΥΛΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):

Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 20 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (20-30 κ.εκ./ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα.

φάνιση της προσβολής. **Δόση:** 20 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (20-30 κ.εκ./ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (βερικοκιά, ροδακινιά, κερασιά, νεκταρινιά, δαμασκηλιά), Βατόμουρο, Σμέουρο, Μύρτιλλα, Συκιά: 1 εφαρμογή.

Πατάτα, Τομάτα (Θ+Υ), Μελιτζάνα (Θ+Υ), Πιπεριά (Θ+Υ), Αγγούρι (Θ+Υ), Αγγουράκι για τουρσί (Θ+Υ), Κολοκυθάκι (Θ+Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Βαμβάκι, Καπνός, Καλλωπιστικά (τριαντάφυλλο, γαρύφαλλο, χρυσάνθεμο, ζέρμπερα) (Θ+Υ), Φράουλα (Υ+Θ): 2 εφαρμογές.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Βατόμουρο, Σμέουρο, Μύρτιλλα, Συκιά: 14 ημέρες.
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κο-

λοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Φράουλα Υπαίθρου: 3 ημέρες.

Πατάτα, Βαμβάκι: 21 ημέρες.

Καπνός: 7 ημέρες.

Φράουλα Θερμοκηπίου: 1 ημέρα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: • Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. • Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συμιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας. • Εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτό των χλωρονικοτινιλίων. • Να μην χρησιμοποιείται το CALYPSO 480 SC σε καλλιέργειες όπου εφαρμόστηκαν άλλα εντομοκτόνα της ομάδας των χλωρονικοτινιλίων στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. • Σε περίπτωση που τα χλωρονικοτινίλια δεν είναι πλέον αποτελεσματικά, να μην εφαρμόζεται το CALYPSO 480 SC και να σταματήσει η χρήση εντομοκτόνων της ομάδας αυτής.

Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες):

Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες οι οποίες απέχουν λιγότερο από:

- **5 μέτρα** για τις καλλιέργειες αγρού και **20 μέτρα** για τις δενδρώδεις

καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.

- **5 μέτρα** για τις δενδρώδεις καλλιέργειες από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συμιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για τις καλλιέργειες αγρού και 20 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τη μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ** έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Γενικά: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σε σταθερό μέρος σε πλάγια (πλευρική) θέση. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

24/7

GR80239866E

Bayer

Bayer Ελλάς ABEE

Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι

τηλ: 210 6166000

fax: 210 6109100

www.bayercropscience.gr





caLypso®
480 SC

100ml e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14004 / 4-2-2008

Πυκνό Εναιώρημα (SC)

Εγγ. Σύνθεση: thiacloprid 48% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 57,5% β/β

Διασυστηματικό Εντομοκτόνο

επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση
για την αντιμετώπιση κυρίως μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος
για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ

