



GR80246072G



decis
protech 15 EW

2,4 L e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14346 / 17-2-2010

Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 1,5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 98,51% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο

επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική

συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ABEE

Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



**BONUS
STICKER**

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΝΤΕΣΙΣ ΠΡΟΤΕΚ 15 ΕW

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασσητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκρίμενα στους διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκάσμος φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: • Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέπ-φρούτ, Νερατζιά:

Αφίδες (*Myzus persicae*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

Λεκάνιο (*Saissetia oleae*), Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών.

Δόση: 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: • Αμυγδαλιά, Φισικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά:

Αφίδες (*Hyalopterus spp.*), Καρπόκαψα Καρυδιάς (*Laspeyresia romonella*), Καρπόκαψα Καστανιάς (*Laspeyresia splendana*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (70-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 140 λίτρα / στρέμμα.

Δόση: 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (70-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

Ευρύτομο (*Eurytoma plotnicovi*). Με την έναρξη των πτήσεων των ακμιαίων με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: • Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσουλιά:

Καρπόκαψα της Μηλιάς (*Laspeyresia romonella*), Ψύλλα Μηλιάς (*Psylla mali*), Αφίδες (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80* κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 - 140 λίτρα / στρέμμα.

Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 60 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (60-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.

Ψύλλα Αχλαδιάς (*Psylla pyri*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: •Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά:

Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*), Ανάρσια (*Anarsia lineatella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 60 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (60-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.

Ραγολέπιδα (*Rhagoletis cerasi*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 65-80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (65-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.

Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.

Αφίδες (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Hyalopterus pruni*), Καρπόκαψα δαμασκηλιάς (*Laspeyresia funebrana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-115 κ.εκ.

σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.

•**ΑΜΠΕΛΙ**:**

Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. (1η γενεά), 80-115 κ.εκ. (2η και 3η γενεά) σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

Κοχυλίδα (*Clysia ambiguella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80-115 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

Τζιτζικία (*Empoasca spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

•**ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαιθρου & Θερμοκηπίου):**

Αφίδες (*Aphis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

•**ΕΛΙΑ:**

Δάκος (*Bactrocera (Dacus) oleae*). Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.

Λεκάνιο (*Saissetia oleae*). Με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.

Βαμβακάδα (*Euphyllura spp.*) Με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.

Πυρηνотρήτης (*Prays oleae*). Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. **Δόση:** 50 κ.εκ. (ανθοβ. γενεά) σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού, 80 κ.εκ. (καρποβ. γενεά) σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.

• **Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο:**

Θρίπας (*Thrips tabaci*), Κοφτοσκοούληκα (*Agrotis spp.*).

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα / στρέμμα.

• **ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (Υπαίθρου):**

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Sporoptera spp.*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Βρωμούσα (*Nezara viridula*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Κοφτοσκοούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα / στρέμμα.

• **Πιπεριά (θερμοκηπίου)**

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Sporoptera spp.*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα / στρέμμα.

Βρωμούσα (*Nezara viridula*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα / στρέμμα.

Αλευρώδης (*Trialeurodes vaporariorum*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 115 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (70-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα / στρέμμα.

• **ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτα, Μελπζάνα (θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Βρωμούσα (*Nezara viridula*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα / στρέμμα.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ:

• **Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):**

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Αφίδες (*Aphis spp.*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (Υπαίθρου: 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα, Θερμοκηπίου: 50-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** Υπαίθρου: 60-100 λίτρα / στρέμμα, Θερμοκηπίου: 60-140 λίτρα / στρέμμα.

• **Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου):**

Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50-80

κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα / στρέμμα.

• **Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο:** Πιερίδα (*Pieris spp.*), Μαμέστρα (*Mamestra brassicae*), Πλούζια (*Plusia gamma*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Brevicoryne brassicae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα / στρέμμα. Πλουτέλλα (*Plutella xylostella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα / στρέμμα.

• **Μαρούλι (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*), Αφίδες (*Nasonovia ribis-nigri*, *Hyperomyzus lactucae*, *Aphis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

• **Μαϊντανός, Φύλλα σέλινου, Ρόκα:**

Αφίδες (*Aphis spp.*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Μαμέστρα (*Mamestra spp.*), Άλτης (*Chrysodeixis chal-*

cites). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (60 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 70 λίτρα / στρέμμα.

Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα / στρέμμα.

ΨΥΧΑΝΘΗ (όσπρια):

• **Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια:**

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis spp.*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

• **Μπιζέλια Φρέσκα (αρακάς):**

Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σιτόνα (*Sitona spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 40 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

Αφίδα των κουκιών (*Aphis fabae*), Κάμπια των μπιζελιών (*Laspeyresia nigricana*), Θρίπας (*Thrips angusticeps*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

• **Αγκινάρα:**

Κασσιδα (*Cassida spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των

προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

Προντένια (*Spodoptera litura*), Αφίδες (*Anuraphis cardui*, *Myzus persicae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

• **Πατάτα:**

Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Δόση: 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα / στρέμμα.

Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Δόση: 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα / στρέμμα.

• **Βαμβάκι:**

Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα / στρέμμα.

Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*), Τζιτζικάκια (*Empoasca spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα / στρέμμα.

Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Αφίδα (*Aphis gossypii*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση

των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα / στρέμμα.

• **Καπνός:**

Θρίπας (*Thrips tabaci*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

• **Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι:**

Αφίδες (*Aphis fabae*, *Myzus persicae*), Μύγα των τεύπλων (*Pegomya spp.*), Άλτης (*Chaetocnema tibialis*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα / στρέμμα.

Κασσιίδα (*Cassida nebulosa*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα / στρέμμα.

• **Αραβόσπορος***:**

Πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Σεζάμια (*Sesamia nonagrioides*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα / στρέμμα.

Diabrotica virgifera. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7-14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ.

σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα / στρέμμα.

ΣΙΤΗΡΑ:

• **Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη:**

Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-60 λίτρα / στρέμμα.

• **Μηδική:**

Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σκαθάρι των μπιζελιών (*Apion pisi*), Φυτονόμιος (*Hypera postica*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 40 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40 λίτρα / στρέμμα.

• **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):**

Αφίδες (*Myzus spp.*), Θρίπες (*Thrips tabaci*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (40-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Αλευρώδης (*Trialeurodes vaporariorum*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 115 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα / στρέμμα.

Φυλλοδέτες (*Archips spp.*, *Adoxophyes spp.*, *Pandemis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 60 κ.εκ. σκευάσματος / 100

λίτρα ψεκαστικού υγρού (30-60 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Συκιά** (Χρήση Ήσσονος Σημασίας):**

Ασημένιος σκώρος (*Autographa* sp., *Barathra* sp., *Simaethis nemorana*), Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*), Λογχαία ή μαύρη μύγα των σύκων (*Carpolonchaea aristella*), Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*), Ψύλλα συκιάς (*Homotoma ficus*): Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Δόση:** 40-80 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-100 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80 λίτρα/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

***ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 80 κ.εκ. σκευάσματος/ hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt / στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 80 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

****** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

******* Η εφαρμογή του **DECIS PROTECH 15 EW** στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.*

******** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια της συκιάς. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή

τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με Decis. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών / στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, **ειδικό σύστημα μικροδοκιμής**, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

- **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νερατζιά), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βουσσινιά), **Ελιά, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι, ΣΙΤΗΡΑ** (Σπάρρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): 1.
- **ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά), **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά), **Λάχανο** (εκτός από το κινέζικο), **Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαϊντανός, Φύλλα σέλινου, Ρόκα, ΨΥΧΑΝΘΗ** (όσπρια): **Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια Φρέσκα** (αρακάς), **Βαμβάκι, Μηδική, Συκιά**: 2.
- **Αμπέλι, Φράουλα** (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου), **Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ** (Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα), **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ** (Αγγούρι - Αγγουράκι - Κολοκύθι - Πεπόνι - Καρπούζι), **Μαρούλι** (Υπαίθρου), **Αγκινάρα, Πατάτα, Καπνός, Αραβόσιτος, Καλλωπιστικά** (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): 3.
- **ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ** (Πιπεριά - Τομάτα - Μελιτζάνα): 4.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- **Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νερατζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αραβόσιτος, Σπάρρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη**: 30 ημέρες.
- **Μηδική, Συκιά**: 14 ημέρες.

- **Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο** (εκτός από το κινέζικο), **Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μπιζέλια, Καπνός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βουσσινιά, Φύλλα Σέλινου, Μαϊντανός, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια**: 7 ημέρες.
- **Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα, Αγκινάρα**: 3 ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμίους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ -

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Περιέχει benzylsalicylate, alpha-hexylcinnamaldehyde. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από σώματα επιφανειακών υδάτων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την καλλιέργεια της ελιάς, 20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας. Απομακρύνετε ή καλύψτε (εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης) τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί μία ημέρα μετά τη χρήση. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωμένο. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα απλώστε κρέμα βιταμίνης E ή απλό γαλάκτωμα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύντε τα αμέσως πολύ καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Πληροφορίες για το γιατρό:** Θεραπευτικά μέτρα: Επιτόπιος χειρισμός: Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% Amethocaine Hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά εάν χρειαστεί. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία, για παιδιά 2,5 μg ενδοφλεβίως. **Αντενδείξεις:** Ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

24/7

GR80246072G



GR80246072G



decis
protech 15 EW

2,4 L e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14346 / 17-2-2010

Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 1,5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 98,51% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο

επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική

συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



ΠΡΟΣΟΧΗ

