



decis
trap

20 Παγίδες

Αρ. Άδειας Διάθεσης
στην αγορά Υ.Α.Α.Τ.:
14478/ 16-04-2014

Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα
Βοηθητικές προσελκυστικές ουσίες: 8,33 γρ./παγίδα

Εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο - Ετοιμόχρηστη παγίδα
προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill)
για την καταπολέμηση της Μύγας της
Μεσογείου (*Ceratitis capitata*).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 834/07 ΚΑΙ 889/08

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι. Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΤΕΣ ΤΡΑΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) σε δένδρα/δένδρες καλλιέργειες, αμπελι και τροπικά φρούτα με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα απρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της παγίδας, η οποία είναι εμποτισμένη με πυρεθροειδές εντομοκτόνο (deltamethrin).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η παγίδα αναρτάται απευθείας στο δένδρο.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΤΥΠΟΣ- ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Δ.Ο.- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ/ ΣΤΡΕΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

• **Εσπεριδοειδή** (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιτ-φρουτ, Μασχολέμονο (Λαίμ), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλάδι τύπου "Nashi", Κυδωνιά, Μουσαμουλιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερκοκιά): Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*, *Ceratitis spp.*). **Τύπος:** Ετοιμόχρηστη παγίδα.

Περιεκτικότητα σε δ.ο.: 0,015 γρ. deltamethrin/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικών/παγίδα. **Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής:** Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 ενήλικη/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες. **Αριθμός παγίδων/ στρέμμα:** 5-8.

• **Αμπέλι** (εμπριμαζέο, ανοποισήμο): Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*, *Ceratitis spp.*). **Τύπος:** Ετοιμόχρηστη παγίδα. **Περιεκτικότητα σε δ.ο.:** 0,015 γρ. deltamethrin/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικών/παγίδα. **Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής:** Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 ενήλικη/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες. **Αριθμός παγίδων/ στρέμμα:** 5-8.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα στομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε στον καθαρό αέρα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Βυάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε

• **Τροπικά φρούτα** (Μάνγκο, Λυτάς, Σικιά, Κουμ Κουάτ, Ακτινιδιά, Star Fruit (*Averrhoa carambola*)): Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*, *Ceratitis spp.*). **Τύπος:** Ετοιμόχρηστη παγίδα. **Περιεκτικότητα σε δ.ο.:** 0,015 γρ. deltamethrin/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικών/παγίδα. **Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής:** Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 ενήλικη/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες. **Αριθμός παγίδων/ στρέμμα:** 5-8.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συστάσιμες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Όλες οι καλλιέργειες: 1.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ:

Όλες οι καλλιέργειες. Μη εφαρμόζομαι.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν πραγμαμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εγκαθίστανται σε σημεία συλλογής για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

ΣΥΝΗΚΕΣ ΑΠΟΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Διατηρείται στην αρχική του απορροστική συσκευασία, καλά κλειστά, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε σακούλα εντός κυλίνδρου

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε σακούλα εντός κυλίνδρου

Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης Bayer **24/7**
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλύνετε τη περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξπλύνετε το στόμα. Κρατήστε σε ρεζιμία. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Κίνδυνοι: Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθροειδές. Η δηλητηρίαση από πυρεθροειδή δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή από καρβαμικά ή οργανοφωσφορικά.

Θεραπεία: Επείσοπος χειρισμός: Συνιστάται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή. Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών. Σε περίπτωση σπασμών, η χορήγηση βενζοδιαζεπίνης (diazepam) είναι η θεραπεία επιλογής.

Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης. **Αντένδειξη:** ατροπίνη. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Η ανάρρωση είναι αυτονόητη και χωρίς επακόλουθα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777



5 200309 898505 >

Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.bayercropsolutions.gr

GRB1692416B