

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Το κενό υλικό συσκευασίας εξηλώνεται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό εξέλιμμα (τα νερά του εξελίγματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχήσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Διατηρείστε το στην αρχική, απαροβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπετε στο καπάκι της φιάλης. **ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:** Βλέπετε ένα μέρος φιάλης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Πρώτες Βοήθειες

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από σύλληψη: Γενικά: Σε περίπτωση συλληψίματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή και εάν είναι δυνατό δείξτε την επίστα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα σε περίπτωση εισπνοής ατμών ή προϊόντων αποδόμησης. Παραγγείλετε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν παραστεί ανάγκη. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι, ή - εάν είναι διαθέσιμη - polyethylene glycol 400. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλεφάρια, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Λάβετε ιατρική περίθαλψη εάν εμφανιστεί και παραμένει ερεθισμός. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Προκαλέστε εμετό μόνο εάν: 1. Ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του, 2. Δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια άμεσα διαθέσιμη, 3. Καλή ποσότητα έχει καταποθεί (περισσότερο από μια γουλιά), 4. Δεν έχει περάσει περισσότερο από 1 ώρα από τη στιγμή της κατάποσης (σε περίπτωση εμετού αποφεύγετε την εμετόρρηση του υγρού στην αναπνευστική οδό). Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα: Προσωρινά θηπιή όραση εξαιτίας της αμολογής της κόρης των ματιών (myosis) μετά από επαφή με τα μάτια, βρογχικοαδία, χαμηλή πίεση, σιελόρροια, βρογχική υπερέκκριση, εμετός, διάρροια, επιδρωση, μυϊκή σπασμοί, σπασμοί, δυσκολία αναπνοής, παράλυση του αναπνευστικού συστήματος, υπνηλία, κόπια, αναπνευστική ανεπάρκεια, υποθερμία, συσπώσεις ναυτία. Το προϊόν περιέχει παρεμποδιστή της χοληστερόλης.

Θεραπεία: Παρακολούθηση των αναπνευστικών, καρδιακών και κεντρικού νευρικού συστήματος. Έλεγχος του αριθμού των αιμοσφαιρίων. Παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρους: ερυθρά αιμοσφαίρια και τη χοληστερόλη πλάσματος, ECG - παρακολούθηση (Ηλεκτροκαρδιογράφημα). Διατηρήστε τους αεραγωγούς ελεύθερους, χορηγήστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνευστική υποστήριξη εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα στις 2 πρώτες ώρες. Ωστόσο, συσταείται σε κάθε περίπτωση η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θιακό νάτριο.

Γενικά αποδεκτό αντιδοτο: στροπίνη

Πριν τη χορήγηση του αντιδοτού, αναγγυρεθείτε ότι τα συμπτώματα είναι ξεκάθαρα ή ότι η δραστηριότητα της χοληστερόλης είναι χαμηλότερη από το 30% του φυσιολογικού. Σε περίπτωση εμφάνισης σπασμών χορηγήστε βενζοδιαζεπίνη (π.χ. διαζεπάμη).

Αντενδείξεις: οξέμια (pralidoxime, obidoxime)

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777.



Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14.418/02-04-2013

Συμπυκνωμένο Ελαιώρημα (SC)

Εγγ. σύνθεση:
Δραστική ουσία: methiocarb 20% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 81,61% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ



Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση του Θρίπα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΜΕΣΟΥΡΟΛ 200 SC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση του Θρίπα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, κολοκαυθίου, καλλωπιστικών και σε καλλιέργειες κρεμμυδιού, σκόροδου, ασκαλώσιου κρεμμυδιού και πράσου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασιμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε αναθεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, και συμπληρώστε με νερό αναθεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:

ΤΟΜΑΤΑ (Θερμοκηπίου), **ΠΙΠΕΡΙΑ** (Θερμοκηπίου), **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ** (Θερμοκηπίου): Θρίπας της Καλιφόρνια (*Frankliniella occidentalis*), Θρίπας (*Thrips tabaci*). Ψεκασιμός φυλλώματος πριν την άνθηση. **Δόση:** 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρέμμα. **Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 14 ημέρες.

ΑΓΓΟΥΡΙ (Θερμοκηπίου), **ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ** (Θερμοκηπίου), **ΚΟΛΟΚΥΘΙ** (Θερμοκηπίου): Θρίπας της Καλιφόρνια (*Frankliniella occidentalis*), Θρίπας (*Thrips tabaci*). Ψεκασιμός φυλλώματος πριν την άνθηση. **Δόση:** 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρέμμα. **Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 14 ημέρες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.** • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφυγείτε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. • Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ, ΑΣΚΑΛΩΣΙΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ (*Allium cepa* var. *aggregatum* (syn. *Allium ascalonicum*): Θρίπας (*Thrips tabaci*). Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Δόση:** 750 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (375 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρέμμα. **Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 7 ημέρες.

ΠΡΑΣΟ: Θρίπας (*Thrips tabaci*). Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Δόση:** 750 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (375 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρέμμα. **Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 10 ημέρες.

ΑΝΘΗ & ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Θερμοκηπίου): Θρίπας της Καλιφόρνια (*Frankliniella occidentalis*), Θρίπας (*Thrips tabaci*). Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Δόση:** 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (500 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 7 ημέρες. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

• Τομάτα (Θερμοκηπίου), Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου), Πιπεριά (Θερμοκηπίου), Αγγούρι (Θερμοκηπίου), Αγγουράκι (Θερμοκηπίου), Κολοκίθι (Θερμοκηπίου): Πριν την άνθηση. • Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώσιον Κρεμμύδι (Σκορδοκρέμμυδο): 28 ημέρες. • Πράσο: 35 ημέρες. • Άνηθ & Καλλωπιστικά (Θερμοκηπίου): Μη εφαρμόσιμα. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:** • Όλες οι καλλιέργειες: 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίστας.



GB61697248B

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20,
151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

900
800
700
600
500
400
300
200