

Κερασιά



Ολοκληρωμένες λύσεις
φυτοπροστασίας



Ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας

Κερασιά

| | | BBCH | 00 | 01 | 57 | 61 | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------|--|--|--|--------------------|----------|---------------------------|
| | | Βλαστικό στάδιο | Λήθαργος | Φούσκωμα μαπιών | Λευκή κορυφή | Άνθηση | Πτώση πετάλων | Εμφάνιση καρπιδίων | Αύξηση μεγέθους καρπών | Αρχές ωρίμανσης | Ωρίμανση | PHI ¹ (ημέρες) |
| ΩΔΙΟ | Flint max 75WG | | | | | | 20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ — ¹ M.E: 10-12, M.A.E: 3 | | | | | 7 |
| | Luna experience 400SC | | | | | | 33,5 κ.εκ./100λτ - 150 λτ/στρ - M.E:14, M.A.E:3 ² | | | | | 3 |
| ΜΟΝΙΛΙΑ | Serenade max WP | | | | | | | | 250-400 γρ/100λτ — 50-100 λτ/στρ — M.E: 7, M.A.E:4 | | | 3 |
| | Luna experience 400SC | | | | | | 42-50 κ.εκ./100λτ - 150 λτ/στρ — M.E:7-14, M.A.E: 2 ² | | | | | 3 |
| | Flint max 75WG | | | | | | 20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ — M.E: 12-14 ³ , M.A.E: 3 | | | | | 7 |
| | Teldor 50WG | | | | | | | | 100-150 γρ/στρ - 150-250 λτ/στρ | | | 1 |
| ΕΞΩΑΣΚΟΣ | Flint max 75WG | | | | | | 20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ — M.E: 12-14, M.A.E: 3 | | | | | 7 |
| ΚΟΡΥΝΕΟ | Copperfield 20WG | | | 325-425 γρ/100λτ | 100-120 λτ/στρ | M.A.E:4 | | | | | | - |
| ΒΟΤΡΥΤΗΣ | Teldor 50WG | | | | | | | | 100-150 γρ/στρ - 150-250 λτ/στρ | | | 1 |
| ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ | Serenade max WP | | | | | | | 50-400 γρ/100λτ — 50-100 λτ/στρ — M.E: 7, M.A.E:4 | | | | 3 |
| ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ | Copperfield 20WG | | | 325-425 γρ/100λτ | 100-120 λτ/στρ | M.A.E:4 | | | | | | - |
| ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ | Envidor 240SC | | | | | | | 40 κ.εκ./100λτ — 150 λτ/στρ — M.A.E:1 | | | | 14 |
| ΑΦΙΔΕΣ | Calypso 480SC | | | | | | | ⁴ 15 κ.εκ./100λτ - 100-150 λτ/στρ - M.A.E:1 | | | | 14 |
| | Decis protech 15EW & Decis 25EC | | | | | | 50-80 κ.εκ./100λτ EW15 - 30-50 κ.εκ./100λτ EC25 100-140 λτ/στρ — M.A.E:1 | | | | | 7 |
| | Movento 1500D | | | | | | ⁵ 60 κ.εκ./100λτ - 50-150 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:2 | | | | | 21 |
| ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ | Decis protech 15EW & Decis 25EC | | | | | | 60 κ.εκ./100λτ 15EW - 35 κ.εκ./100λτ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1 | | | | | 7 |
| ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ | Decis protech 15EW & Decis 25EC | | | | | | 65-80 κ.εκ./100λτ 15EW - 40-50 κ.εκ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1 | | | | | 7 |
| ΑΝΑΡΣΙΑ | Decis protech 15EW & Decis 25EC | | | | | | 60 κ.εκ./100λτ 15EW - 35 κ.εκ./100λτ 25EC 100-140 λτ/στρ — M.A.E:1 | | | | | 7 |
| ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | Decis protech 15EW & Decis 25EC | | | | | | 80 κ.εκ./100λτ 15EW - 50 κ.εκ./100λτ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1 | | | | | 7 |
| | Decis trap | | | | | | 5 - 8 παγίδες ανά στρέμμα — M.A.E: 1 | | | | | - |
| ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ | Decis protech 15EW & Decis 25EC | | | | | | 50-80 κ.εκ./100λτ 15EW - 30-50 κ.εκ/10λτ 25EC 100-140 λτ/στρ— M.A.E:1 | | | | | 7 |

1. M.E: Μεσοδιάστημα Εφαρμογών, **M.A.E:** Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, **PHI:** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή **2.** Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα. **3.** Πριν τη συγκομιδή το μεσοδιάστημα εφαρμογών είναι 7 ημέρες **4.** Προληπτικά σε συνδυασμό με θερινό λάδι 2% μέχρι το στάδιο της ρόδινης κορυφής. Κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής μετά την άνθηση και πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση **5.** Με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ σκευάσματος ανά στρέμμα

