

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστημής Έργων
Σωρού 18-20, 15125 Μοσχάτο
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr



ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ.
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Πριν τη χρήση διαβάστε τις προειδοποιητικές φράσεις
και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.

Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2019

Πυρηνόκαρπα



Ολοκληρωμένες λύσεις
φυτοπροστασίας



Ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας

Πυρηνόκαρπα



Βλαστικό στάδιο	Καλλιέργεια	Λίθθαρος	Φούσκωμα μαπιών	Ρόδινη ή λευκή κορυφή	Άνθηση	Πτώση πετάλων	Εμφάνιση καρπιδίων	Αύξηση μεγέθους καρπών	Αρχές ωρίμανσης	Ωρίμανση	PHI (ημέρες)
ΩΔΙΟ	Flint 50WG	P-N-B					15 γρ./100λτ. - 100 λτ./στρ. - M.E: 10-14, M.A.E: 3				7
	Flint max 75WG	P-N-B-Δ-K					20 γρ./100λτ. - 150 λτ./στρ. - M.E: 10-12, M.A.E: 2 (Δ-Κ: 3 εφ)				7
	Folicur 25WG	P-N					50 γρ./100λτ. ² - 150 λτ./στρ. - M.E: 14, M.A.E: 2				7
	Luna Experience 400SC	P-N-B-K-Δ					37,5-50 ¹ κ.εκ./100λτ. - 50-100 λτ./στρ. - M.E: 14, M.A.E: 3				3
ΜΟΝΙΛΙΑ	Serenade max WP	P-N-B-Δ-K						250-400 γρ./100λτ. - 50-100 λτ./στρ. - M.E: 7, M.A.E: 4			3
	Serenade ASO	P-N-B-K-Δ-BY-A-KO		400 - 800 κ.εκ./στρ (267 κ.εκ./ μ. ύψους κόμης για 1,5-3 μέτρα ύψους κόμης)			50-150 λτ/στρ - M.E: 5, M.A.E: 6				-
	Luna Experience 400SC	P-N-B-K-Δ					40-50 ¹ κ.εκ./100λτ. - 50-150 λτ./στρ. - M.A.E: 1 ή 2 με M.E: 7ημ ³				3
	Flint max 75WG	P-N-B-Δ-K					20 γρ./100λτ. - 150 λτ./στρ. - M.E: 12-14, M.A.E: 2 (Δ-Κ: 3 εφ)				7
	Folicur 25WG	P-N					50-75 γρ./100λτ. - 100-150 λτ./στρ. ² - M.E: 14, M.A.E: 2				7
	Teldor 50WG	K						100-150 γρ./στρ. - 150-250 λτ./στρ.			
Copperfield 20WG	P-B		P (270-425), B (325-410)		M.A.E: 4 (B 3)						-
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΤΡΥΤΗ	Luna experience 400SC	P-N-B-K-Δ					50 ¹ κ.εκ./100λτ. - 50-150 λτ./στρ. - M.A.E: 1 ή 2 με M.E: 7ημ ³				3
ΕΞΘΑΣΚΟΣ	Flint max 75WG	P-N-B-Δ-K					20 γρ./100λτ. - 150 λτ./στρ. - M.E: 12-14, M.A.E: 2 (Δ-Κ: 3 εφ)				7
	Copperfield 20WG	P	270-425 γρ./100λτ.	100-120 λτ./στρ. M.A.E: 4							-
ΚΟΡΥΝΕΟ	Copperfield 20WG	P-B-K-A	270-425 γρ./100λτ.	100-120 λτ./στρ. (ανάλογα την καλλιέργεια)	M.A.E: 4 M.A.E: 4 (B, A 3)						-
ΣΚΩΡΙΑΣΗ	Luna experience 400SC	P-N-B-K-Δ					37,5-50 ¹ κ.εκ./100λτ. - 50-100 λτ./στρ. - M.E: 14, M.A.E: 3				3
ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΩΣΗ	Copperfield 20WG	P	270-425 γρ./100λτ.	100-120 λτ./στρ. M.A.E: 4							-
ΒΟΤΡΥΤΗΣ	Teldor 50WG	K						100-150 γρ./στρ. - 150-250 λτ./στρ.			1
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ	Serenade max WP	P-N-B-Δ-K						250-400 γρ./100λτ. - 50-100 λτ./στρ. - M.E: 7, M.A.E: 4			3
	Serenade ASO	P-N-B-K-Δ-BY-A-KO		400 - 800 κ.εκ./στρ (267 κ.εκ./ μ. ύψους κόμης για 1,5-3 μέτρα ύψους κόμης)			50-150 λτ/στρ - M.E: 5, M.A.E: 6				3
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ	Copperfield 20WG	P-A	270-425 γρ./100λτ.	100-120 λτ./στρ. M.A.E: 4							-
ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	Envidor 240SC	P-N-B-Δ-K					40 κ.εκ./100λτ. - 150 λτ./στρ. - M.A.E: 1				14
ΑΦΙΔΕΣ	Calypso 480SC	P-N-B-K					45 κ.εκ./100λτ. - 100-150 λτ./στρ. - M.A.E: 1				14
	Decis Protech 15EW, Decis 25 EC, Decis Expert 100EC	P-N-B-Δ-K-BY					EW15 / EC25 / EC100 : 50-80 / 30-50 / 7,5-12,5 κ.εκ./100λτ., 100-140 λτ/στρ - M.A.E: 1				7
	Movento 1500D	P-N-B-Δ-K					60-80 κ.εκ./στρ. - 100 -150 λτ./στρ. - M.E: 14-21, M.A.E: 2				21
	Movento Gold 100SC	P-N-B-Δ-K					5 75-100 κ.εκ./100λτ. - 50-150 λτ./στρ. - M.E: 14, M.A.E: 2				21
ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ	Movento 1500D	P-N-B-Δ-K					150 κ.εκ./στρ. - 50-150 λτ./στρ. - M.E: 14-21, M.A.E: 2				21
	Movento Gold 100SC	P-N-B-Δ-K					10 120-150 κ.εκ./100λτ. - 50-150 λτ./στρ. - M.E: 14, M.A.E: 2				21
ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ	Calypso 480SC	P-N-Δ-K					15 κ.εκ./100λτ. - 100-150 λτ./στρ. - M.A.E: 1				14
ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ	DECIS Protech 15EW, 25 EC, Expert 100EC	P-N-B-Δ-K-BY					EW15 / EC25 / EC100 : 60 / 35 / 8,75 κ.εκ./100λτ., 100-140 λτ./στρ. - M.A.E: 1				7
ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ	DECIS Protech 15EW, 25 EC, Expert 100EC	K					EW15 / EC25 / EC100 : 65-80 / 40-50 / 10-12,5 κ.εκ./100λτ., 100-140 λτ./στρ. - M.A.E: 1				7
ΑΝΑΡΣΙΑ	DECIS Protech 15EW, 25 EC, Expert 100EC	P-N-B-Δ-K-BY					EW15 / EC25 / EC100 : 60 / 35 / 8,75 κ.εκ./100λτ., 100-140 λτ./στρ. - M.A.E: 1				7
ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	DECIS Protech 15EW, 25 EC, Expert 100EC	P-N-B-Δ-K-BY					EW15 / EC25 / EC100 : 80 / 50 / 12,5 κ.εκ./100λτ., 100-140 λτ/στρ - M.A.E: 1				7
	Decis trap	P-N-B-Δ-K					5 - 8 παγίδες ανά στρέμμα - M.A.E: 1				-
ΕΥΡΥΤΟΜΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ	DECIS Protech 15EW, 25 EC, Expert 100EC	A					EW15 / EC25 / EC100 : 80 / 50 / 12,5 κ.εκ./100λτ., 100-140 λτ/στρ - M.A.E: 1				7
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ	DECIS Protech 15EW, 25 EC, Expert 100EC	P-N-B-Δ-K-BY					EW15 / EC25 / EC100 : 50-80 / 30-50 / 7,5-12,5 κ.εκ./100λτ., 100-140 λτ/στρ - M.A.E: 1				7

P (Ροδακινιά) - N (Νεκταρινιά) - B (Βερικοκιά) - Δ (Δαμασκηλιά) - K (Κερασιά) - BY (Βυσσινιά) - A (Αμυγδαλιά) - KO (Κορομηλιά)
M.E: Μεσοδιάστημα Εφαρμογών, M.A.E: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο, PHI: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

- 1 Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιερητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα.
- 2 Ο μεγάλος όγκος νερού (150 λτ/στρ) να χρησιμοποιείται με τη χαμηλή δόση ακευάσματος (50 γρ. κ.κ./100 λτ) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. ακευάσματος/στρέμμα.
- 3 Μία εφαρμογή ανά καλλιερητική περίοδο ή εναλλακτικά 2 εφαρμογές από τα μέσα Αυγούστου έως το τέλος Οκτωβρίου στις καλλιέργειες που αυτό είναι εφαρμοσίμο.
- 4 Προληπτικά σε συνδυασμό με θερινό λάδι 2% μέχρι το στάδιο της ρόδινης κορυφής. Καταστατικά με την εμφάνιση της προσβολής μετά την άνθηση και πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση
- 5 Στην μαύρη αφίδα της κερασιάς και της δαμασκηλιάς η δόση είναι 75 - 150 κ.εκ. / 100 λτ.

