



decis®

2,5 EC

1 Λίτρο e

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: deltamethrin 2,5% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 97,15% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο

επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών
και μασσητικών εντόμων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος

για την τελική συσκευασία και σήμανση:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι

Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



BayWin

Πρόγραμμα Επιβράβευσης

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14.343 / 11-2-2010

**BONUS
STICKER**

900

800

700

600

500

400

300

200

GR80254989C



ΤΕΣΣΙΣ 2,5 EC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ)

• ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ- Φρουτ, Νερατζιά:

Αφίδες (*Myzus persicae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

Λεκάνιο (*Saissetia oleae*). Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

• ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά:

Αφίδες (*Hyalopterus* spp.), Καρπόκαφα Καρυδιάς (*Laspeyresia pomonella*), Καρπόκαφα Καστανιάς (*Laspeyresia splendana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 140 λίτρα/ στρέμμα.

Δόση: 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/ στρέμμα.

Ευρύτομο (*Eurytoma plotnicovi*). Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

• ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά:

Καρπόκαφα της Μηλιάς (*Laspeyresia pomonella*), Αφίδες (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*), Ψύλλα Μηλιάς (*Psylla mali*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50* κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 35 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (35-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

Ψύλλα Αχλαδιάς (*Psylla pyri*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ. σκευάσματος/

στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

• ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά: Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*), Ανάρσια (*Anarsia lineatella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 35 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (35-49 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

Ραγολέπιδά (*Rhagoletis cerasi*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 40-50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

Αφίδες (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Hyalopterus pruni*), Καρπόκαφα της δαμασκηλιάς (*Laspeyresia funebrana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

• ΑΜΠΕΛΙ**:

Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. (1η γενεά), 50-70 κ.εκ. (2η και 3η γενεά) σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

Κοχυλίδα (*Clysia ambiguella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-70 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

Τζιτζικάκια (*Empoasca* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

• ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):

Αφίδες (*Aphis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα.

• ΕΛΙΑ:

Δάκος (*Bactrocera oleae*). Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

Λεκάνιο (*Saissetia oleae*). Με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

Βαμβακάδα (*Euphyllura* spp.). Με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

Πυρηνολήτης (*Prays oleae*). Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά

την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλλησης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. **Δόση:** 30 κ.εκ. (ανθόβια γενεά) σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, 50 κ.εκ. (καρπόβια γενεά) σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα.

• Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο:

Θρίπτας (*Thrips tabaci*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/ στρέμμα.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ:

• Τομάτα – Πιπεριά – Μελιτζάνα (Υπαίθρου):

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Δορυφόρος (*Lepidotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-100 λίτρα/ στρέμμα.

Βρωμούσα (*Nezara viridula*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 30 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (18-30 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-100 λίτρα/ στρέμμα.

Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα.

• Πιπεριά (θερμοκηπίου):

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Δορυφόρος (*Lepidotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-140 λίτρα/ στρέμμα.

Βρωμούσα (*Nezara viridula*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 30 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (18-42 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα/ στρέμμα.

Αλευρώδης (*Trialeurodes vaporariorum*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 70 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα.

• Τομάτα – Μελιτζάνα (θερμοκηπίου):

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Δορυφόρος (*Lepidotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-100 λίτρα/ στρέμμα.

Βρωμούσα (*Nezara viridula*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα

7 ημερών. **Δόση:** 30 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (18-42 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα/ στρέμμα.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ:

• Αγγούρι – Αγγουράκι – Κολοκύθι – Πεπόνι – Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Αφίδες (*Aphis* spp., *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (Υπαίθρου: 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα, Θερμοκηπίου: 30-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** Υπαίθρου: 60-100 λίτρα/ στρέμμα, Θερμοκηπίου: 60-140 λίτρα/ στρέμμα.

• Αγγούρι – Αγγουράκι – Κολοκύθι – Πεπόνι – Καρπούζι (Υπαίθρου):

Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα.

• ΛΑΧΑΝΟ (εκτός από το κινέζικο), ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ:

Πιερίδα (*Pieris* spp.), Μαμέστρα (*Mamestra brassicae*), Πλούζια (*Plusia gamma*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Brevicoryne brassicae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/ στρέμμα.

Πλουτέλλα (*Plutella xylostella*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/ στρέμμα.

• ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθρου):

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*), Αφίδες (*Hyperomyzus lactucae*, *Aphis* spp., *Nasonovia ribis-nigr*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα.

Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα.

• ΣΠΑΝΑΚΙ:

Αφίδες (*Aphis* spp.), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Μαμέστρα (*Mamestra* spp.), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (35 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 70 λίτρα/ στρέμμα.

Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 35 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα/ στρέμμα.

• ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ, ΣΕΛΙΝΟ, ΡΟΚΑ, ΑΝΤΙΔΙ:

Αφίδες (*Aphis* spp.), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Μαμέστρα (*Mamestra* spp.), Άλτης

(*Chrysodeixis chalcites*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (35 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 70 λίτρα/ στρέμμα.

Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα/ στρέμμα.

ΨΥΧΑΝΘΗ:

- **Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια:**

Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis* spp.), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Δόση: 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα.

- **Μπιζέλια:**

Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σιτόνα (*Sitona* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 25 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/ στρέμμα.

Αφίδα των κουκιών (*Aphis fabae*), Κάμπια των μπιζελιών (*Laspeyresia nigricana*), Θρίπας (*Thrips angusticeps*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

- **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:**

Κασσίδα (*Cassida* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

Προντένια (*Spodoptera litura*), Αφίδες (*Anuraphis cardui*, *Myzus persicae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα.

- **ΠΑΤΑΤΑ:**

Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/ στρέμμα.

Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/ στρέμμα.

- **BAMBAKI:**

Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-70 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/ στρέμμα.

Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*), Τζιτζικάρια (*Empoasca* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/ στρέμμα.

Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Αφίδα (*Aphis gossypii*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/ στρέμμα.

- **ΚΑΠΝΟΣ:**

Θρίπας (*Thrips tabaci*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα.

- **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΣΕΣΚΟΥΛΟ, ΠΑΝΤΖΑΡΙ:**

Αφίδες (*Aphis fabae*, *Myzus persicae*), Μύγα των τεύτλων (*Pegomya* spp.), Άλτης (*Chaetocnema tibialis*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/ στρέμμα.

Κασσίδα (*Cassida nebulosa*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/ στρέμμα.

- **ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ***:**

Πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Σεζάμια (*Sesamia nonagrioides*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/ στρέμμα.

Diabrotica virgifera. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7-14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/ στρέμμα.

ΣΙΤΗΡΑ:

- **Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη:**

Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-60 λίτρα/ στρέμμα.

- **Μηδική:**

Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σκαθάρι των μπιζελιών (*Apion pisi*), Φυτονόμος (*Hypera postica*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 25 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40 λίτρα/ στρέμμα.

- **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):**

Αφίδες (*Myzus* spp.), Θρίπες (*Thrips tabaci*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα.

Φυλλοδέτες (*Archips* spp., *Adoxophyes* spp., *Pandemis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 35 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (17,5-35 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα.

Αλευρώδης (*Trialetrodes vaporariorum*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 70 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ.

σκευάσματος/ στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα/ στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- * **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. **Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.**

- ** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
- *** Η εφαρμογή του Decis 2,5 EC στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp. στην περίπτωση που η προσβολή αυτή υπάρχει.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

- **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά), **Ελιά, Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι, ΣΙΤΗΡΑ** (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): 1.
- **ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά), **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά), **Λάχανο** (εκτός από το κινέζικο), **Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Σπανάκι, Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, ΨΥΧΑΝΘΗ** (Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια), **Μπιζέλια, Βαμβάκι, Μηδική:** 2.
- **Αμπέλι, Φράουλα** (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), **Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ** (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα), **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ Υπαίθρου και Θερμοκηπίου** (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι), **Μαρούλι** (Υπαίθρου), **Αγκινάρα, Πατάτα, Καπνός, Αραβόσιτος, Καλλωπιστικά** (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): 3.
- **ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ** (Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα): 4.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 30 ημέρες.
Μηδική: 14 ημέρες.

Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια, Καπνός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά: 7 ημέρες.

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, Αγκινάρες, Σπανάκι: 3 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με DECIS. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, **ειδικό σύστημα μικροδοκιμής**, έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

Αρ. Παρτίδας - Ημερ. Παρασκευής - Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. • Γείωση / ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. • Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. • Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια. • Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά 20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
- Ξεπλύντε το στόμα με νερό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΙΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα απλώστε κρέμα βιταμίνης Ε ή απλό γαλάκτωμα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευτείτε γιατρό.

Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπευτικά μέτρα :

Επítőπιος χειρισμός: συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% Amethocaine Hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά εάν χρειαστεί.

Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία· για παιδιά 2,5 μg ενδοφλεβίως.

Αντενδείξεις: ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 - 7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

24/7

GR80254989C

Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
τηλ: 210 6166000
fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr





decis®

2,5 EC

1 Λίτρο e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14.343 / 11-2-2010

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: deltamethrin 2,5% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 97,15% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο

επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών
και μασσητικών εντόμων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος
για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



BayWin

Πρόγραμμα Επιβράβευσης

GR80254989C

