



**MOVENTO®**  
2XSYS 150 OD

**100 ml e**

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά  
Υ.Α.Α.Τ.: 14.603 / 10.03.2017

GR80199562G

**Ελαιώδες Εναιώρημα (OD)**

Εγγυημένη σύνθεση: spirotetramat 15% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 84,06% β/β

## ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική  
διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι,  
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**



**ΠΡΟΣΟΧΗ**



## **MOBENTO 150 OD**

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:**

Εντομοκτόνο, ανήκει στη νέα χημική ομάδα των τετραμικών οξέων και εμφανίζει νέο τρόπο δράσης (παρεμποδιστής βιοσύνθεσης λιπιδίων). Εμφανίζει δράση στομάχου στους εχθρούς-στόχους. Μετά την εφαρμογή το spirotetramat διεισδύει στα φύλλα και με τη διπλή διασυστηματική του δράση (ανοδική & καθοδική / ακροπέταλη & βασιπέταλη) μετακινείται σε ολόκληρο το φυτό. Επιδρά κυρίως στα ατελή στάδια, τα οποία παγιδεύονται μεταξύ δύο εκδύσεων και θανατώνονται επειδή δεν μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης. Μειώνει επίσης την ικανότητα των θηλυκών εντόμων να αναπαραχθούν και τη βιωσιμότητα των απογόνων τους. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται νωρίς και έγκαιρα, προκειμένου να διεισδύσει το spirotetramat στα φυτά και να σταματήσει την εξέλιξη της προσβολής.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος με καλή κάλυψη/ διαβροχή της φυλλικής επιφάνειας.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Αποφεύγετε το συνδυασμό του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

### **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ):**

#### **• ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ**

##### **ΑΜΠΕΛΙ:**

**ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ** (*Planococcus* sp, *Planococcus ficus*, *Pseudococcus* sp), **ΛΕΚΑΝΙΟ** (*Lecanium corni*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης.

**1η εφαρμογή** όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού, **2η εφαρμογή** όταν αρχίσει να «κλείνει» το σαμπί. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis* spp.). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 40-50 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

##### **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά:

**ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** Ψώρα Σαν Ζοζέ (*Quadraspidiotus perniciosus*), Μυτιλόμορφη ψώρα (*Lepidosaphes* sp), **ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ** (*Eriosoma lanigerum*). **Κοκκοειδή:** Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές), **Ματόψειρα:** Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης με την εμφάνιση της προσβολής. Συστήνεται να γίνεται πολύ καλή διαβροχή. **Δόση:** 100 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. Υγρού (150 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΑΦΙΔΕΣ** Ρόδινη αφίδα της μηλιάς (*Dysaphis plantaginea*), Ρόδινη αφίδα της αχλαδιάς (*Dysaphis pyri*), Πράσινη αφίδα της μηλιάς (*Aphis pomi*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. Σε υψηλή πίεση προσβολής συστήνεται να χρησιμοποιείται η υψηλότερη συγκέντρωση. **Δόση:** 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (120 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΨΥΛΛΕΣ** Ψύλλα Αχλαδιάς (*Cacopsila pyricolla*, *Psylla pyri*), Ψύλλα Μηλιάς (*Psylla mali*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης. Ψύλλα: Εφαρμογές όταν το 50% των αυγών είναι κίτρινα και το υπόλοιπο 50% λευκά. **Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (150 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά:

**ΑΦΙΔΕΣ** Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (*Myzus persicae*), Πράσινη αφίδα της μηλιάς (*Aphis pomi*), Αλευρώδης αφίδα των πυρηνοκάρπων (*Hyalopterus pruni*, *Hyalopterus amygdali*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. Σε υψηλή πίεση προσβολής συστήνεται να χρησιμοποιείται η υψηλότερη συγκέντρωση. **Δόση:** 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (120 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** Ψώρα Σαν Ζοζέ (*Quadraspidiotus perniciosus*), Βαμβακάδα της ροδακινιάς (*Pseudaulacaspis pentagona*), Λεκάνια πυρηνοκάρπων (*Parthenolecanium corni*, *Eulecanium tiliae*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης, στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (150 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΚΕΡΑΣΙΑ:**

**ΜΑΥΡΗ ΑΦΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ** (*Myzus cerasi*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (150 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, Κιτριά, Γκρέϊπ-Φρουτ, Μοσχολέμονο (Λάιμ), Νερατζιά, Κουμ-κουάτ, Φράπα):

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis spiraecola*, *Aphis gossypii*), **ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** (*Aonidiella aurantii*). **Αφίδες:** Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Κοκκοειδή:** Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (120 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-300 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/21.

**ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ** (*Aleurothrixus floccosus*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 30-50

κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (150 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-300 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/21.

**ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** (*Aspidiotus nerii*, *Parlatoria pergandei*, *Coccus hesperidum*, *Pseudococcus citri*, *Planococcus* sp.). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (150 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-300 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/21.

**ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** (*Saissetia oleae*, *Lepidosaphes* sp.). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 50-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (180 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-300 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/21.

**ΕΛΙΑ:**

**ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** (*Parlatoria oleae*, *Parlatoria pergandei*, *Lepidosaphes* sp., *Saissetia* sp.). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/21.

**ΣΟΛΑΝΩΔΗ Τομάτα (Υ), Πιπεριά (Υ), Μελιτζάνα (Υ):**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Aphis fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 40 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική**

**περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14.

**ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), **ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ** (*Phenacoccus* sp.). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14.

**ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ** Αγγούρι (Υ), Κολοκύθι (Υ), Κολοκυθάκι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ):

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Aphis fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 40 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14.

**ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), **ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ** (*Phenacoccus* sp.). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14.

**ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ** Κρεμμύδι (Υ), Σκόρδο (Υ), Πράσο (Υ), Σχοινόπρασο (Υ):

**ΘΡΙΠΕΣ** (*Thrips* sp., *Thrips tabaci*). Με την εμφάνιση της προσβολής νωρίς με την πρώτη εμφάνιση των ακμαίων (1-2 θρίπες/φυτό). Συστήνεται πρόγραμμα 2-3 εφαρμογών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θρίπα. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 25-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/**

**Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14.

**ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ** Λάχανο (Λευκό, Κόκκινο, Savoy, Κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο:

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Brevicoryne brassicae*, *Aphis* spp.) **ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Aleurodes proletella*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ** Μαρούλι (Υ), Σπανάκι (Υ), Ραδίκι (Υ), Αντίδι (Υ), Λυκοτρίβολο/Βαλεριανέλλα (Υ) (lamb's lettuce), Σαλάτα (Υ), Ρόκα (Υ), Κάρδαμο (Υ), Γαιοκάρδαμο (Υ), Σινάπι/ Σινάπι κόκκινο (Υ) (red mustard): **ΑΦΙΔΕΣ** (*Nasonovia ribisnigri*, *Aphis gossypii*, *Myzus persicae*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 40 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 25-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**ΦΑΣΟΛΙ ΦΡΕΣΚΟ (Υ):**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis fabae*). Μετά το τέλος της άνθησης, με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 40 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/7-14.

**ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Μετά το τέλος της άνθησης, με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/7-14.

**ΒΟΛΒΩΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ – ΛΙΛΙΟΥΜ:**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis gossypii*). Μετά το τέλος της άνθησης, με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 40 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

**ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Μετά το τέλος της άνθησης, με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

**ΘΡΙΠΑΣ** (*Frankliniella occidentalis*). Να εφαρμόζεται νωρίς με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

• **ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ**

**ΣΟΛΑΝΩΔΗ** Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ):

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Aphis fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (75 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 εφαρμογές/ καλλιεργητική περίοδο με max 4 εφαρμογές ανά έτος για 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους. **Μεσοδιάστημα μεταξύ των 2 εφαρμογών:** 14 ημέρες.

**ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 εφαρμογές/καλλιεργητική περίοδο με max 4 εφαρμογές ανά έτος για 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους. **Μεσοδιάστημα μεταξύ των 2 εφαρμογών:** 14 ημέρες.

**ΘΡΙΠΑΣ** (*Frankliniella occidentalis*). Να εφαρμόζεται νωρίς με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. Τα 50 λίτρα νερό/στρέμμα να εφαρμόζονται σε φυτά μέχρι 50 εκ. ύψος. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 εφαρμογές/καλλιεργητική περίοδο με max 4 εφαρμογές ανά έτος για 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους. **Μεσοδιάστημα μεταξύ των 2 εφαρμογών:** 14 ημέρες.

**ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ): ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ** (*Phenacoccus solani*, *Pseudococcus viburni*). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (90 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 εφαρμογές/καλλιεργητική περίοδο με max 4 εφαρμογές ανά έτος για 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους. **Μεσοδιάστημα μεταξύ των 2 εφαρμογών:** 14 ημέρες.

**ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ** Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ) Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα (Θ):

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Aphis fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (75 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 εφαρμογές/καλλιεργητική περίοδο με max 4 εφαρμογές ανά έτος για 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους. **Μεσοδιάστημα μεταξύ των 2 εφαρμογών:** 14 ημέρες.

**ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), **ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ** (*Phenacoccus* sp.). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 εφαρμογές/καλλιεργητική περίοδο με max 4 εφαρμογές ανά έτος για 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους. **Μεσοδιάστημα μεταξύ των 2 εφαρμογών:** 14 ημέρες.

**ΘΡΙΠΑΣ** (*Frankliniella occidentalis*). Να εφαρμόζεται νωρίς με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. Τα 50 λίτρα νερό/στρέμμα να εφαρμόζονται σε φυτά μέχρι 50 εκ. ύψος. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 εφαρμογές/καλλιεργητική περίοδο με max 4 εφαρμογές ανά έτος για 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους.

Μεσοδιάστημα μεταξύ των 2 εφαρμογών: 14 ημέρες.

**ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ** Μαρούλι (Θ), Σπανάκι (Θ), Ραδίκι (Θ), Αντίδι (Θ), Λυκοτρίβολο (Θ)/Βαλεριανέλλα (Θ) (*lamb's lettuce*), Σαλάτα (Θ), Ρόκα (Θ), Κάρδαμο (Θ), Γαιοκάρδαμο (Θ), Σινάπι/ Σινάπι κόκκινο (Θ) (*red mustard*):

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Nasonovia ribisnigri*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum* sp., *Acyrtosiphon* sp., *Aulacorthum* sp., *Uroleucon sonchi*, *Aphis* spp., *Aphis gossypii*, *Aphis fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Pemphigus bursarius*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 40-50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 25-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**ΦΑΣΟΛΙ ΦΡΕΣΚΟ (Θ): ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis gossypii*, *Aphis fabae*, *Myzus persicae*). Μετά το τέλος της άνθησης, με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14.

**ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (65 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14.

**ΜΠΙΖΕΛΙ ΦΡΕΣΚΟ (Θ):**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis gossypii*, *Aphis fabae*, *Myzus persicae*). Με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος**

**αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14.

**ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ):**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Aphis forbesi*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum rosae*, *Acyrtosiphon kondoi*, *Chaetosiphon fragaefolii*, *Rhodobium porosum*). Εφαρμογή κατά τη βλαστική ανάπτυξη των φυτών και μέχρι 14 ημέρες πριν την άνθηση. **Δόση:** 50-67 κ. εκ./ στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**ΑΚΑΡΕΑ** (*Tarsonemus pallidus*), **ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Εφαρμογή κατά τη βλαστική ανάπτυξη των φυτών και μέχρι 14 ημέρες πριν την άνθηση. **Δόση:** 67 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ (Θ):**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphidina*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (40 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-80 λίτρα/ στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14.

**ΘΡΙΠΑΣ** (*Frankliniella occidentalis*). Να εφαρμόζεται νωρίς με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της άνθησης. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (65 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-80 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά**

**καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 4/7-14.**  
**ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΧΗΣ)¹**

**Αμπέλι (ΧΗΣ):**

**ΦΥΛΛΟΞΗΡΑ** (*Phylloxera* sp.). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2/14.**

*Aleurocanthus spiniferus* (QUAINTANCE). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης. 1η εφαρμογή: όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού. 2η εφαρμογή: όταν αρχίσει να «κλείνει» το τσαμπί. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2/14-21.**

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, Κιτριά, Γκρέϊπ φρουτ, Μοσχολέμονο (Λάιμ), Νερατζιά, Κουμ-κουάτ, Φράπα):

*Aleurocanthus spiniferus* (QUAINTANCE) (ΧΗΣ) Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (150 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-300 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2/21.**

**ΕΛΙΑ (ΧΗΣ):**

*Aleurocanthus spiniferus* (QUAINTANCE). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 50

κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2/21.**

**Ροδιά (ΧΗΣ):**

**ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** (*Saissetia oleae*, *Ceroplastes* sp., *Coccus hesperidum*, *Parthenolecanium corni*, *Pseudococcus* sp., *Planococcus citri*, *Planococcus* sp., *Parlatoria oleae*, *Lepidosaphes* sp., *Lepidosaphes granati*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2/14.**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis punicae*, *Aphis gossypii*), **ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Bemisia tabaci*, *Dialeurodes citri*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2/14.**

**Αβοκάντο (ΧΗΣ):**

**ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** (*Pseudococcus adonidum*, *Pseudococcus calceolarie*, *Pseudococcus obscurus*, *Pseudococcus* sp., *Planococcus citri*, *Planococcus* sp.) Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 100-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα**

εφαρμογών (ημέρες): 2/14.

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis gossypii*, *Aphis* sp. L, *Myzus persicae*, *Myzus* sp.). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 100-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**Λωτός (ΧΗΣ):**

**ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** (*Ceroplastes* sp., *Coccus hesperidum*, *Coccus pseudomagnoliarum*, *Parthenolecanium corni*, *Pseudauleacaspis pentagona*, *Pseudococcus* sp., *Pseudococcus obscurus*, *Planococcus citri*, *Planococcus* sp., *Parlatoria oleae*), **ΨΥΛΛΑ ΤΟΥ ΛΩΤΟΥ** (*Trioza diospyri* (Ashmead)). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές/νεαρές λάρβες). **Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**ΘΡΙΠΑΣ** (*Scirtothrips inermis*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής νωρίς με την πρώτη εμφάνιση των ακμαίων (1-2 θρίπες/φυτό). **Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis gossypii*, *Aphis* sp. L, *Myzus persicae*, *Myzus* sp.). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της

προσβολής. **Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**Μούρα (ΧΗΣ) (Βατόμουρο, Σμέουρο, Μύρτιλλο):**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis* sp. L), **ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** (*Lecanium* sp.). Εφαρμογή στην καλλιέργεια, κατά την περίοδο μετά τη συγκομιδή. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ** Κρεμμύδι (Υ) Σκόρδο (Υ) Πράσο (Υ) Σχοινόπρασο (Υ)

**ΨΥΛΛΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ** (*Bactericera tremblayi* Wagner). Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 25-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/7-14. **Φασόλι ξερό (Υ), Φακή (Υ) (ΧΗΣ):**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis* sp. L, *Aphis fabae*, *Myzus persicae*), **ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), **ΘΡΙΠΕΣ** (*Thrips tabaci*). Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Μην το εφαρμόζετε κατά την περίοδο ανθοφορίας. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14

**Βότανα (ΧΗΣ) (Μαϊντανός, Σέλινο, Άνιθος, Μάραθος):**

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Aphis* sp. L, *Myzus persicae*), **ΘΡΙΠΑΣ** (*Thrips tabaci*). Με την

εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φουντουκιά (ΧΗΣ).**

**ΗΜΙΠΤΕΡΑ** (*Monosteira unicastata*, *Philaenus spumarius*), **ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ**

(*Eurytoma amygdali* (*Eurytoma amygdali*), *Dryocosmus kuriphilus*),

**ΑΦΙΔΕΣ** (*Myzus persicae*, *Aphis* sp.), **ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** (*Diaspididae*:

*Aonidiella aurantii*, *Aspidiotus* sp., *Chrysomphalus dictyospermi*,

*Diaspis* sp., *Diaspis pentagona*, *Epidiaspis leperii*, *Lepidosaphes*

*ulmi*, *Pseudalacaspis pentagona*, *Parlatoria oleae*, *Quadraspidiotus*

*juglansregiae*, *Quadraspidiotus perniciosus*, *Sphaerolecanium prunastri*,

**Coccidae:** *Coccus hesperidum*, *Ceroplastes rusci*, *Eulecanium* sp.,

*Eulecanium persicae*, *Planococcus/Pseudococcus citri*, *Saissetia oleae*).

Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση:

**Ημίπτερα, Υμενόπτερα, Αφίδες:** Εφαρμογές με την εμφάνιση της

προσβολής. **Κοκκοειδή:** Εφαρμογές στα ευαίσθητα στάδια (κινητές

μορφές). **Δόση:** 110 κ. εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/

στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/**

**Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 1-2/14-21.

**Φισικιά (ΧΗΣ).**

**ΗΜΙΠΤΕΡΑ** (Ψύλλα της Φισικιάς: (*Agonoscena* spp, *Agonoscena*

*pistaciae*, *Agonoscena targionii*), *Monosteira unicastata*), **ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ**

(**Ευρύτομο Φισικιάς** (*Eurytoma pistaciae*), *Stathmopoda* /*Palumbina*

*guerini*, **ΑΦΙΔΕΣ** (*Myzus Persicae*, *Aphis* sp.), **ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** *Diaspididae*

(*Anapulvinaria pistaciae*, *Aspidiotus nerii*, *Diaspis* sp., *Epidiaspis*

*leperii*, *Lepidosaphes pistaciae*, *Melanaspis inopinata*, *Parlatoria oleae*,

*Parthenolecanium pruinum*, *Parthenolecanium corni*), **Coccidae**

(*Ceroplastes rusci*, *Coccus hesperidum*, *Pulvinaria pistaciae*, *Saissetia*

*oleae*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης μέχρι την έναρξη της

ωρίμανσης: **Ημίπτερα, Υμενόπτερα, Αφίδες:**

Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. **Κοκκοειδή:** Εφαρμογές

στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 110 κ. εκ./στρέμμα.

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός**

**εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών**

**(ημέρες):** 1-2/14-21.

**Ακτινιδιά (ΧΗΣ).**

**ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ** *Diaspididae* (*Aonidiella aurantii*, *Aspidiotus nerii*, *Aspidiotus*

sp. *Chrysomphalus dictyospermi*, *Diaspis* sp. *Epidiaspis leperii*,

*Eulecanium persicae*, *Lepidosaphes* sp, *Melanaspis inopinata*, *Parlatoria*

*oleae*, *Planococcus* /*Pseudococcus citri*, *Parthenolecanium pruinum*,

*Parthenolecanium corni*, *Pseudalacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus*

*perniciosus*, *Quadraspidiotus juglansregiae*, *Saissetia oleae*), **Coccidae**

(*Sphaerolecanium prunastri*, *Ceroplastes rusci*, *Chrysomphalus*

*dictyospermi*, *Hemiberlesia lataniae*, *Hemiberlesia rapax*, *Melanaspis*

*inopinata*, *Coccus hesperidum*), **Metcalfa pruinosa**.

Εφαρμογές από το στάδιο που καρπός έχει αποκτήσει το 10% του

τελικού του μεγέθους έως την έναρξη της ωρίμανσης. **Κοκκοειδή:**

Εφαρμογές στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Metcalfa pruinosa:**

Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.

**Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού (100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ.**

**υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 1-2/14.

**Παρατηρήσεις:**

1. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες Αμπέλι (ΧΗΣ: Φυλλοξήρα, *Aleurocanthus spiniferus*), Εσπεριδοειδή (ΧΗΣ: *Aleurocanthus spiniferus*), Ελιά (ΧΗΣ: *Aleurocanthus spiniferus*), Ροδιά, Αβοκάντο, Λωτός, Μούρα, Βολβώδη Λαχανικά (ΧΗΣ: Ψύλλα Κρεμμυδιού), Φασόλι (Ξερό), Φακή, Βότανα, Αμυγδαλιά, Καστανιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Ακτινιδιά, Φιστικιά. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά: **21 ημέρες.**

Αμπέλι, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, Κιτριά, Γκρέϊπ φρουτ, Μοσχολέμονο (Λάιμ), Νερατζιά, Κουμ-κουάτ, Φράπα, Ελιά, Ροδιά, Αβοκάντο, Λωτός Αμυγδαλιά, Καστανιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Ακτινιδιά, Φιστικιά: **14 ημέρες.**

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Κολοκύθι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Λάχανο (Λευκό, Κόκκινο, Σανου, Κινέζικο), Μπρόκολο, Κουνουπίδι: **3 ημέρες.**

Μαρούλι, Σπανάκι, Αντίδι, Λυκοτρίβολο/Βαλεριανέλλα (lamb's lettuce), Σαλάτα, Ρόκα, Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Σινάπι κόκκινο (red

mustard), Φασόλι φρέσκο, Μπιζέλι φρέσκο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Πράσο, Σχοινόπρασο, Φασόλι Ξερό, Φακή, Βότανα (Μαϊντανός, Σέλινο, Άνιθος, Μάραθος): **7 ημέρες.**

Φράουλα, Βολβώδη Καλλωπιστικά – Λίλιουμ, Χρυσάνθεμο, Μούρα: -

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, η επόμενη καλλιέργεια μπορεί να φυτευτεί/σπαρθεί μετά από τριάντα (30) ημέρες.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:** Βλέπε συσκευασία.

## ΠΡΟΣΟΧΗ



**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:** • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα και στο έμβρυο. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** • Μακριά από παιδιά. «Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές». • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τις διάφορες φάσεις χειρισμού του σκευάσματος». «Να μην εισέρχονται οι εργάτες στον αγρό προτού το ψεκαστικό διάλυμα στεγνώσει τελείως». «Εάν η επανείσοδος στον αγρό γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή, οι εργάτες πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο». «Οι εργάτες να φορούν προστατευτικά γάντια κατά την επανείσοδο στον αγρό». • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μian ασφάλεια ζώνη προστασίας 3 μέτρων μέχρι τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες του Αμπελιού, των Μηλοειδών, των Πυρηνόκαρπων, της Ροδιάς, του Αβοκάντο, του Λωτού, των Μούρων, της Ελιάς, των Εσπεριδοειδών, της Αμυγδαλιάς, της Καρυδιάς, της Καστανιάς, της Φουντουκιάς, της Φιστικιάς και της Ακτινιδιάς και 1 μέτρου μέχρι τη μη γεωργική γη από τις καλλιέργειες των Λαχανικών (Σολανώδη, Κολοκυνθοειδή, Βολβώδη, Κραμβοειδή, Φυλλώδη) και της Φράουλας. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian ασφάλεια ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων ή να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της Ελιάς και των Εσπεριδοειδών. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

## **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

### **Πρώτες Βοήθειες**

- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

### **Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:**

**Γενικά:** Απομακρύνετε τον πάσχοντα από την περιοχή κινδύνου και τοποθετείστε τον σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα βρεγμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Εάν ο ερεθισμός αναπτυχθεί και επιμένει, καλέστε αμέσως γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύντε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

### **Πληροφορίες για το γιατρό:**

**Θεραπεία:** πρώτες βοήθειες, απομόλυνση, συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer

**24/7**

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**



# Bayer

Bayer Ελλάς ABEE

Τομέας Επιστήμης Γεωργίας

Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι

Τηλ: 210 6166000

Fax: 210 6109100

[www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)



GR80199562G



5 200309 858318 >



**MOVENTO®**  
2XSYS 150 OD

**100 ml e**

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά  
Υ.Α.Α.Τ.: 14.603 / 10.03.2017

**Ελαιώδες Εναιώρημα (OD)**

Εγγυημένη σύνθεση: spirotetramat 15% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 84,06% β/β

## ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική  
διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι,  
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**



**ΠΡΟΣΟΧΗ**



GR80199562G