



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΙΑ: **Κυκλοπόνια** (*Cycloponum uliginosum*) [Siphonota ascaris]: Εργασίες από αρχές φθινοπώρου έως τέλη άνοιξης. Δόση: Φθινόπωρο: 265-800 ημερ./ακρότητα/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-1780 ημερ./σεξουάλες/τρίψματα). Άνοιξη: 265-625 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-1600 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). **Όγκος ξεκακαλιού υγρού:** 150-300 λίτρα/τρίψμα.

ΛΟΙΣΤΟΠΥΡΑ (*Gleasonium ulmariae*, διάσπορες): η πρώτη από τα πρώτα να ωριμάζουν και κερδίζουν τη θέση τους στην επιφάνεια. Δόση: 599 ημερ./ακρότητα/100 λίτρα χεχ. υγρού (865-1780 ημερ./σεξουάλες/τρίψματα).

ΚΑΡΙΝΗΜΩΝ (*Pseudomona savastiana*): Μερτά να κλέβουν και μετά από γρήγορή ή παύση. Δόση: Φθινόπωρο: 265-800 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-1780 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). Άνοιξη: 265-625 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-1600 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). **Όγκος ξεκακαλιού υγρού:** 150-300 λίτρα/τρίψμα.

ΤΟΜΑΤΑ (+) ΡΕΠΕΡΑ (+) ΠΕΠΕΡΑ (+) ΡΕΠΕΡΟΝΟΤΕΣ (*Phrygantheria infestans*, *Peronospora tabacina*): Εργασίες από το στάδιο των νεαρών σποριοφυτών και στοπάρηση στις 10-14 ημέρες. Δόση: Βαράν Προβόλη: 270-400 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-625 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). Ελαιόρα Προβόλη: 270-400 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-625 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). **Όγκος ξεκακαλιού υγρού:** 50-100 λίτρα/τρίψμα.

ΑΓΡΩΧΑΝΗ (*Colletichneum sp.*) ΣΕΠΤΩΡΙΑΣ (*Seporia leucophaea*), ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΑ (*Cladosporium fulvum*): Με τη εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και σταμάτησή της 7-10 ημέρες ανάλογα με την έκταση της προσβολής. Δόση: Βαράν Προβόλη: 270-625 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-625 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). Ελαιόρα Προβόλη: 270-400 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-400 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). **Όγκος ξεκακαλιού υγρού:** 50-100 λίτρα/τρίψμα.

ΒΑΚΤΗΡΙΩΔΗΣ (*Xanthomonas vesicatoria*, *Pseudomonas* spp.): Εργασίες από το στάδιο των νεαρών σποριοφυτών μέχρι την καρπώση. Δόση: Βαράν Προβόλη: 270-625 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-625 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). Ελαιόρα Προβόλη: 270-400 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-400 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). **Όγκος ξεκακαλιού υγρού:** 50-100 λίτρα/τρίψμα.

ΚΟΛΟΚΥΘΟΕΛΙΑ (+) ΑΓΟΥΡΑ (+) ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΛΕΠΙΝΑ, ΚΑΡΠΟΖΩ: Περισπορίες: *Pseudoperonospora cubensis*, **ΑΓΡΩΧΑΝΗ** (*Colletichneum lagenarium*), **ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΑ** (*Cladosporium fulvum*). Εργασίες από το στάδιο των νεαρών σποριοφυτών μέχρι την εμφάνιση των ασθενειών και σταμάτησή της 10-14 ημέρες ανάλογα με την έκταση της προσβολής. Δόση: 270-275 ημρ./σεξουάλες/100 λίτρα χεχ. υγρού (395-275 ημρ./σεξουάλες/τρίψματα). **Όγκος ξεκακαλιού υγρού:** 50-100 λίτρα/τρίψμα.