

Τρόπος δράσης: Είναι μήγα των δραστικών ουσιών terbutylazine που ανήκει στην ομάδα των τριαζίνων και pendimethalin που ανήκει στην ομάδα των διντροανιλινών. Η terbutylazine παροφράται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα όπου παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση. Το pendimethalin παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στους μεριστωματικούς ιστούς.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με μπάρα ψεκασμού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γείγετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά το σκευάσμα μέσα στη κλειστή συσκευασία του και προσθέτε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτε την υπόλοιπη ποσότητα νερού συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΔΟΣΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται προφυτρωτικά όλων των καλλιεργειών μετά τη σπορά τους. Αραβόσιτος: Ετήσια αγρωτική και πλατυύριλλα ζάχανα, δόση 400 κ.εκ./στρ. Βαμβάκι: Ετήσια ζάχανα (αγρωτώδη, πλατυύριλλα) και ποινιετή (βέλιουρας, αγράδα) σε δόση από 400-600 κ.εκ./στρ. Μεγαλύτερες δόσεις για τα μετρίως ευαίσθητα* ζάχανα (αγράδα, αγριοβαμβάκι, βέλιουρα). Ογκος ψεκαστικού υγρού: Για όλες της καλλιεργειών 20-50 λίτρα/στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις: 1. Καταπολεμούμενα ζάχανα: Καλαπότα: Πολύ ευαίσθητα: *Polygonum aviculare* (Ποτούκι), *Polygonum convolvulus* (Ποτούνιανο), *Portulaca oleracea* (Αντράκι), *Veronica persicaria* (Βερόνικα). Ευαίσθητα: *Amaranthus retroflexus* (Τραχύ Βλήτο), *Chenopodium album* (Λουβούδι), *Datura stramonium* (Τάτουλας), *Echinochloa crus-galli* (Μουχτίτσα), *Polygonum perfoliatum* (Αγριοπιτεριά), *Setaria spp.* (Σετάρια), *Solanum nigrum* (Αγριοτομάτι), *Xanthium spp.* (Αγκάδι). Μετρίως ευαίσθητα: *Abutilon theophrasti* (Αγριοβαμβάκι), *Euphorbia prostrata*, *Heliotropium europaeum* (κονιό ήλιοτρόπιο), *Solanum physalifolium*, *Bamboo*. Ευαίσθητα: *Amaranthus retroflexus* (Τραχύ Βλήτο), *Chenopodium album* (Λουβούδι), *Datura stramonium* (Τάτουλας), *Polygonum perfoliatum* (Αγριοπιτεριά), *Portulaca oleracea* (Αντράκι), *Solanum nigrum* (Αγριοτομάτι), *Xanthium strumarium* (Αγριομέττρια), *Echinochloa crus-galli* (Μουχτίτσα). *Μετρίως ευαίσθητα: *Abutilon theophrasti* (Αγριοβαμβάκι), *Sorghum halepense* (βέλιουρας). Για τα *Cynodon dactylon* (Αγριά δραριούζεται η δόση 500 κ.εκ./στρ.). Η δράση του FIBRANTO® στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την έδαφικη υγρασία. Εάν δεν αναμένεται βροχόπτωση έντονος 2 βρεδομάρτιν, συνιστάται ελαφρύ πότισμα 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή για την ενωμάσωση – «ενεργοποίηση» του ζάχαντούντος στο έδαφος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και –ποτράς ή ηφύτευσης των καλλιεργεών που ακολουθούν: Ως προναλαμπάνεται η εφαρμογή του προϊόντος στον ίδιο αγρό εντός διαστήματος 12 μηνών. Διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών θα πρέπει να παρέλθει από την εφαρμογή του προϊόντος (αράβη και στις περιπτώσεις αποτυλάσας της αρχικής των καλλιεργειών αραβούσιου ή βαμβακιού) για τη σπορά αλλών καλλιεργειών, εκτός βέβαια από τις καλλιεργείς για τις οποίες συνιστάται (αραβόσιτος και βαμβακιά) καθώς και φασόλι. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται καλή κατεργασία του έδαφους πριν τη σπορά τους. –της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφερθείτε το σκευάσμα: Δεν πρέπει να γίνεται σε ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσετε το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μήν τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα αποτυπώση προστασίας για τη μάτια/πρόσωπο. Φοράτε καπάλληλα γάντια και προστατευτική ενδύμασιά κατά την ανάμελη/φορτωσή και κατά την εφαρμογή. Μήν αναπνέετε σκόνη/ αναδυμασιές/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφεύματα. Πλυθεύτε σχόλιστικα με δέρθον νερό και οσπούν μετά το χειρισμό. Σε περίπτωση επανειδούσιο στην καλλιέργεια εντός 7 ημερών οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδύμασιά και γάντια. Διάθεση του περιεχόμενου/ περιέκτη συμφρωνία με την εθνική νομοθεσία. Μήν ρυπαίνετε το νερό με το σκευάσμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατεύετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων ή μία αιγάκαπτη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά υδάτα για την καλλιέργεια του αραβόσιτου και μία αιγάκαπτη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από τα επιφανειακά υδάτα για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Για να προστατεύετε τα φυτά μητρόχοις να αφήσετε μια αιγάκαπτη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».



Fibranto®

1L e

Αρ. εγκρ. κυκλ.: 70224/13-07-2017

ΜΙΓΜΑ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ (ZC)

Ευρέως Φάσματος προφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση ετήσιων ζιζανίων

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Terbuthylazine	12,50% (β/ο)
Pendimethalin	25,00% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες:	65,09% (β/β)

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής:
OXON ITALIA, SpA

Via Sempione, 195, 2016 Pero (MI), Italy

Υπεύθυνος επικοινωνίας και τελικής διάθεσης στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.ΠΕ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400
Τηλ.: 210 5223834, Fax: 210 5223139,
Email: info@spicam.gr



ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Bayer

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τομέας Επιστήμης Γεωργίας

Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr



ΕΣΥΡΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΡΡΟΦΑΣΩΝ



Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer
από σταθμό 800 1135 353
από κοντή: 210 6166 332

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Αφαιρέστε αμεσώς τα μολυσμένα ρούχα στα οποία έπεισε ψεκαστικό υγρό. Κρατήστε τον αισθητή ζεστό, σε άνετη θέση ανέτα και καλύψτε για λογούς ασφαλείας. Σε περίπτωση εισιτήριος: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθάρο αέρα και καλέστε γιατρό για λογούς ασφαλείας. Σε περίπτωση επαρφής με το δέρμα: Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σπανώντες και ξέπλυντε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαρφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθάρο νερό προτού χρησιμεύσετε μάσκα. Σε περίπτωση κατάσπονσης: Μην προκαλέστε εμέτο, καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επικείμενου συμβαίνουν στην ανθρώπη: Αιτητήστε για τουλάχιστον 48 ώρες. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. KΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ: 210 779377

Ειδικές συνήθειες γεωργικής, φυτούγεις ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες τα σκευάσματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείεται: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μεθόδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) οπου αυτό είναι σύντοπο και να γίνεται εναλλαγή ζιζανικούντων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την απορύγηνα ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόβαση του φυτορροπαθετικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφόταν προηγουμένως με τρύπημα εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύρωση ή ανάπτυξη ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαίσθησης ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα πρόϊόντα τους: Δεν προκαλείται φυτοτοξικότητα στις συνισταμένες χρήσης και δόσεις. Στο βαμβάκι, κατά τη διάσημες συνήθειες ανάπτυξης των φυτών μπορεί να εμφανισθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας χωρίς επίπτωση στην παραγωγή. Να μην εφαρμόζεται σε αναλόγων σε γλυκό καλαμπόκι.

Τελευταία επιμέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Αραβόσιτος, Βαμβάκι: Δεν ορίζεται (προφυτρωτική εφαρμογή).

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθάρο νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανίστονται πλήρως οι αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνήθειες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία σε μέρος δροσερό, έρημο και καλά αεριζόμενο μακριά από πηγές θερμότητας ήμεσο ήλιακο φως. Στις συνήθειες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγράφουμενη ημερομηνία παρασκευής.

Αρ. Παρτίδας/Ημ. Παραγωγή: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει pendimethalin και 1,2-benzisothiazolin-3-όνε.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάσπονσης.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα οργάνα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.